



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DIVISÃO DE ENSINO  
SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E  
ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2024  
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 02/2023



# ENFERMAGEM

Tipo  
"C"

Data da prova:

Domingo, 03/12/2023

## INSTRUÇÕES

- Você recebeu do fiscal:
  - 1 (um) caderno de questões da prova objetiva contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e
  - 1 (uma) folha de respostas personalizada da prova objetiva.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

***A paz do coração é o paraíso dos homens.***

- Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha de respostas da prova objetiva.
- Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala.
- Você somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o caderno de prova no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao término do tempo destinado à realização da prova objetiva.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

## INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
- Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
- A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

LÍNGUA PORTUGUESA  
Questões de 1 a 10

QUESTÃO 1

Por que o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina?

<sup>1</sup> “Do ponto de vista biológico, os menores níveis de testosterona acabam deixando a mulher mais exposta à doença. Por outro lado, na questão social e psicológica, a mulher corriqueiramente está em uma posição de maior vulnerabilidade que o homem e acaba ficando com muitas obrigações, o que aumenta as chances de ela ter mais diagnósticos do que ele.” — Volnei Costa, médico psiquiatra e presidente do conselho científico da Abrata.

[...]

<sup>10</sup> Dartiu Xavier da Silveira, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que estuda depressão há anos, também ressalta que historicamente <sup>13</sup> idosos e adultos jovens (18 a 29 anos de idade) apresentam mais chances de terem o diagnóstico da doença do que <sup>15</sup> outras faixas etárias.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/11/06/por-que-o-brasil-tem-a-populacao-mais-depressiva-da-america-latina.ghtml>>. Acesso em: 12 nov. 2023, com adaptações.

A respeito da pontuação do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A vírgula empregada após a palavra “biológico” (linha 1) marca o deslocamento de uma oração de natureza adverbial.
- (B) O travessão empregado antes de “Volnei Costa” (linha 7) tem a função de explicar o termo já enunciado.
- (C) As aspas empregadas antes de “Do ponto de vista (linha 1) e depois de “ele” (linha 7) têm a função de marcar uma citação indireta.
- (D) O trecho “pesquisador da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)” (linhas 10 e 11) tem valor restritivo.
- (E) O trecho “médico psiquiatra e presidente do conselho científico da Abrata” (linhas 7 e 8) tem função explicativa.

QUESTÃO 2

O Pulso  
Titãs

- <sup>1</sup> Peste bubônica, câncer, pneumonia  
Raiva, rubéola, tuberculose e anemia  
Rancor, cisticercose, caxumba, difteria
- <sup>4</sup> Encefalite, faringite, gripe e leucemia  
[...]  
Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia
- <sup>7</sup> Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia  
Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria  
Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania
- <sup>10</sup> [...]  
Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia  
Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia
- <sup>13</sup> Brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia
- <sup>14</sup> Catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia

Disponível em: <<https://www.lettras.mus.br/titãs/48989/>>. Acesso em: 10 nov. 2023, com adaptações.

Considerando os aspectos linguísticos e as ideias do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 1, o adjetivo “bubônica” confere à palavra “peste” um sentido figurado.
- (B) A palavra “tétano” (linha 12) está empregada em sentido figurado.
- (C) A ênfase retórica do texto recai sobre as doenças físicas.
- (D) Todas as palavras da segunda estrofe (linhas de 6 a 9) são substantivos.
- (E) A palavra “afasia” (linha 14) tem sentido de “apatia” no texto.

QUESTÃO 3

A radical influência da tecnologia no sono das pessoas

<sup>1</sup> Dos monitores de sono até os medicamentos para ficar acordado, o século 21 vem trazendo um conjunto de novas tecnologias capaz de alterar radicalmente a forma <sup>4</sup> como dormimos.

Muitas dessas novas tecnologias pretendem otimizar o sono. Elas prometem ajudar a adaptar o cronograma do <sup>7</sup> sono à nossa vida social, ajudar-nos a dormir por mais tempo ou até pular uma noite de sono por completo.

Analisamos aqui como a tecnologia vem permeando o <sup>10</sup> nosso sono e o que nos reserva o futuro.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/06/13/a-radical-influencia-da-tecnologia-no-sono-das- pessoas.ghtml>>. Acesso em: 10 nov. 2023, com adaptações.

Em relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 10, a forma verbal “reserva” concorda com o sujeito “o futuro”.
- (B) A palavra “capaz” (linha 3) estabelece concordância nominal com “século 21” (linha 2).
- (C) Na linha 5, a palavra “otimizar” tem sentido figurado no texto.
- (D) A forma verbal “prometem” (linha 6) concorda com o sujeito “Muitas dessas novas tecnologias” (linha 5).
- (E) Na linha 1, a palavra “até” estabelece sentido de limitação.

Área livre

## QUESTÃO 4

<sup>1</sup> A lavradora Raimunda Ferreira de Oliveira, de 79 anos de idade, que nunca trabalhou com carteira assinada, lembra como era a saúde antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

<sup>4</sup> — A gente tinha que pagar para ver o médico. Aqui, em Rosário — município maranhense —, tinha um médico <sup>7</sup> só e a gente ia na casa dele para ser atendida quando <sup>8</sup> acontecia alguma coisa.

Disponível em: <[https://noticias.r7.com/saude/qualidade-de-atendimento-ainda-e-desafio-do-sus-19082013?utm\\_source=googleamp](https://noticias.r7.com/saude/qualidade-de-atendimento-ainda-e-desafio-do-sus-19082013?utm_source=googleamp)>. Acesso em: 11 nov. 2023, com adaptações.

Quanto aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A concordância verbal em “A gente tinha” (linha 5) está em desacordo com a norma-padrão.
- (B) O verbo “ver” (linha 5) tem, no texto, sentido que extrapola a percepção pela visão.
- (C) Na linha 6, o emprego de travessões após “Rosário” e “maranhense” marca o discurso direto.
- (D) O verbo “ter”, em “tinha um médico” (linha 6), apresenta sentido de “possuir”.
- (E) A inserção de vírgula após “só” (linha 7) comprometeria a correção gramatical do período.

## QUESTÃO 5

<sup>1</sup> O modelo de atenção à saúde no Brasil resultou, desde o seu início, de trocas e apropriações de experiências entre europeus, índios e africanos, particularmente no que <sup>4</sup> tange à prática médica (PÔRTO, 2006). Com o processo de expansão marítima europeia, iniciado nos séculos 15 e 16, ocorreu um significativo aumento na circulação de <sup>7</sup> mercadorias e contatos entre os povos, mas também houve uma verdadeira “união microbiana” com um novo trânsito de doenças entre territórios distintos.

<sup>10</sup> Com a chegada dos portugueses à Terra de Santa Cruz, um mundo novo e desafiante se formava em relação às enfermidades. Aqui, juntaram-se à malária, doença <sup>13</sup> tropical, até então desconhecida para os europeus, aquelas trazidas pelos colonizadores, como peste bubônica, cólera e varíola e, posteriormente, com a chegada dos africanos, <sup>16</sup> filaríose e a febre amarela.

OLIVEIRA, André Luiz de. *História da saúde no Brasil: dos primórdios ao surgimento do SUS*.

Disponível em: <<https://facasc.emnuvens.com.br/ret/article/view/198>>.

Acesso em: 14 nov. 2023, com adaptações.

Considerando as estruturas linguísticas e os sentidos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 11, a forma verbal “se formava” concorda com “desafiante”.
- (B) O uso do sinal indicativo de crase em “à saúde” (linha 1) e em “à malária” (linha 12) obedece à mesma regra gramatical.
- (C) Os novos contatos entre povos estão dissociados da propagação de doenças no Brasil.
- (D) O emprego de um par de vírgulas, em “desde o seu início” (linha 2), tem função de isolar elemento de natureza adverbial.
- (E) O uso do sinal indicativo de crase em “às enfermidades” (linha 12) justifica-se por uma exigência de natureza verbal.

## QUESTÃO 6

<sup>1</sup> A diversidade racial, presente no Brasil desde a sua colonização, possibilitava um leque de opções de tratamentos, pois os índios, os colonizadores e <sup>4</sup> posteriormente os negros eram detentores de conhecimentos próprios para lidar com as enfermidades. Essas culturas, a partir de suas cosmovisões, ofereciam procedimentos <sup>7</sup> terapêuticos peculiares para as moléstias que ocasionalmente os acometiam.

Desse modo, rezas, feitiços, plantas e ervas nativas <sup>10</sup> eram utilizados rotineiramente por pajés, na população indígena, e por curandeiros, na população negra, únicas formas de acesso à saúde para a maioria da população.

<sup>13</sup> Algumas técnicas foram introduzidas aos poucos. Para quem poderia custear, havia a figura do prático ou barbeiro, que utilizava procedimentos avançados para a <sup>16</sup> época, como sangria ou aplicação de sanguessugas, técnicas <sup>17</sup> utilizadas por médicos europeus.

OLIVEIRA, André Luiz de. *História da saúde no Brasil: dos primórdios ao surgimento do SUS*. Disponível em: <<https://facasc.emnuvens.com.br/ret/article/view/198>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

Acerca dos aspectos linguísticos, da pontuação e dos sentidos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O emprego de vírgulas para isolar “presente no Brasil desde a sua colonização” (linhas 1 e 2) tem função de marcar elemento de natureza adverbial.
- (B) Em “os acometiam” (linha 8), o pronome “os” se refere a “procedimentos terapêuticos peculiares” (linhas 6 e 7).
- (C) “Desse modo” (linha 9) pode ser substituído por **Assim** sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos do texto.
- (D) O emprego de um par de vírgulas para isolar a palavra “posteriormente” (linha 4) alteraria os sentidos do texto e comprometeria sua correção gramatical.
- (E) O uso de vírgula depois da palavra “barbeiro” (linha 15) marca a introdução de uma oração adjetiva restritiva.

Área livre

## QUESTÃO 7

<sup>1</sup> Ao lado de desafios mais recentes, persistem questões relacionadas ao subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS), à precariedade dos vínculos de trabalho e à <sup>4</sup> necessidade de valorização dos trabalhadores através de planos de carreira adequados. Destaca-se também a <sup>7</sup> necessidade de propor diretrizes e ações para o conjunto das profissões relevantes para o SUS, inclusive no que se refere aos profissionais técnicos de nível médio.

Permanece ainda como desafio a aproximação entre a <sup>10</sup> academia e os serviços. As residências constituem um importante caminho para superar essa distância que historicamente preocupa os construtores do sistema de saúde <sup>13</sup> no Brasil.

Disponível em: <<https://agencia.fiocruz.br/resid%C3%AAncias-s%C3%A3o-uma-modalidade-diferenciada-de-forma%C3%A7%C3%A3o>>. Acesso em: 15 nov. 2023, com adaptações.

No que diz respeito à concordância verbal e aos sentidos, seria mantida a correção gramatical e os sentidos do texto, caso

- (A) “persistem” (linha 1) fosse substituído por **persiste**.
- (B) “Destaca-se” (linha 5) fosse substituído por **Destacam-se**.
- (C) “no que se refere” (linha 7) fosse substituído por **no que tange**.
- (D) “Permanece” (linha 9) fosse substituído por **Permanecem**.
- (E) “preocupa” (linha 12) fosse substituído por **preocupam**.

## QUESTÃO 8

<sup>1</sup> Propostas de mudanças na formação em saúde no Brasil vêm sendo discutidas desde o final da década de 1980, com a proposição do Sistema Único de Saúde (SUS). <sup>4</sup> Atualmente, essa discussão ganhou especial relevância quando o Ministério da Saúde (MS) chamou para si a responsabilidade de orientar a formação dos profissionais da <sup>7</sup> saúde para atender às necessidades do SUS.

MACHADO, L. G. F. **Preceptoria: Formação e Competência**. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde). Fortaleza: Universidade Estadual do Ceará, 2017, com adaptações.

Assinale a alternativa que indica a palavra pertencente à classe dos advérbios.

- (A) “Atualmente” (linha 4)
- (B) “final” (linha 2)
- (C) “década” (linha 2)
- (D) “desde” (linha 2)
- (E) “si” (linha 5)

Área livre

## QUESTÃO 9

<sup>1</sup> A concepção de formação apontada na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde explicita claramente, em seus documentos normativos, a <sup>4</sup> intencionalidade de uma educação coerente com a Educação Problematizadora defendida por Paulo Freire – embora essas relações não estejam devidamente referenciadas. <sup>7</sup> Percebem-se diretamente as ideias do pedagogo na afirmação de que o ser humano não pode ser compreendido fora de seu contexto: ele é o sujeito da própria formação e se <sup>10</sup> desenvolve por meio da reflexão a respeito de seu lugar no <sup>11</sup> mundo, sua realidade e suas vivências.

Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/icse/a/4b6HRp4F5sMsSGqc3wSdZhz/>>. Acesso em: 13 nov. 2023, com adaptações.

Com base no texto, é correto afirmar que a concepção de formação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde tem em Paulo Freire uma

- (A) normatização de conceitos.
- (B) pressuposição teórica.
- (C) perspectiva de metodologias.
- (D) referência bibliográfica.
- (E) inspiração de ideias.

## QUESTÃO 10

<sup>1</sup> Apesar dos entraves, principalmente nos momentos iniciais da pandemia, a Atenção Básica permaneceu como a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez <sup>4</sup> que se encontra capilarizada pelos territórios e conta com atuação multiprofissional para a assistência, desde a prevenção até o cuidado dos casos suspeitos e confirmados <sup>7</sup> de Covid-19. Nesse contexto, os residentes compunham as equipes de saúde, atuando na resolutividade de casos sintomáticos leves e no encaminhamento adequado dos <sup>10</sup> casos graves para assistência em alta complexidade.

Disponível em: <<https://scielosp.org/article/sdeb/2023.v47n137/42-57/>>. Acesso em: 11 nov. 2023, com adaptações.

No texto, a locução “uma vez que” (linhas 3 e 4) estabelece uma relação de

- (A) comparação.
- (B) causalidade.
- (C) condição.
- (D) finalidade.
- (E) concessão.

Área livre

## QUESTÃO 11

Consideramos que no mundo existam diversos modelos assistenciais calcados na compreensão da saúde e da doença, nas tecnologias disponíveis em determinada época para intervir na saúde e na doença e nas escolhas políticas e éticas que priorizam os problemas a serem enfrentados pela política de saúde. Por esse motivo, ressaltamos que não há modelos certos ou errados, ou receitas que, quando seguidas, darão certo. Observem o que nos diz Merhy sobre o assunto:

O tema de qualquer modelo de atenção à saúde faz referência não a programas, mas ao modo de se construir a gestão de processos políticos, organizacionais e de trabalho que estejam comprometidos com a produção dos atos de cuidar do indivíduo, do coletivo, do social, dos meios, das coisas e dos lugares. E isto sempre será uma tarefa tecnológica, comprometida com necessidades enquanto valores de uso, enquanto utilidades para indivíduos e grupos (MERHY, 2000:2).

SILVA JÚNIOR, A. G. da; ALVES, C. A. Modelos assistenciais em saúde: desafios e perspectivas. In: MOROSINI, M. V. G. C.; CORBO, A. D. A. *Modelos de atenção e a saúde da família*. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007, p. 27-41.

Com base nos modelos de atenção à saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A partir da década de 1930, a política de saúde pública ainda não havia estabelecido formas mais permanentes de atuação, mesmo com a instalação de centros e postos de saúde para atender, de modo rotineiro, a determinados problemas. Por causa disso, demorou oito anos para se começar a pensar na criação de alguns programas, como pré-natal, vacinação, puericultura, tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e outros.
- (B) No modelo instituído a partir da década de 1930, em que se estruturaram as redes estaduais de saúde, a assistência era voltada para os segmentos mais favorecidos, ou seja, com mais demanda financeira da população.
- (C) A instauração do governo militar, no ano de 1964, determinou novas mudanças. Desunificou os Iaps no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e retirou o foco na assistência à saúde individual, pois as ações de saúde pública eram de responsabilidade dos governos estaduais e do município.
- (D) Em 1975, definiu-se um Sistema Nacional de Saúde em que as atividades de saúde pública deixaram de ser desarticuladas da assistência médica individual e passaram a ser prioritariamente desarticuladas pelo limite da biomédica.
- (E) A maior parte das propostas tecnoassistenciais desenvolvidas para o Sistema Único de Saúde (SUS) centram-se na reorganização da atenção básica. Mas é fundamental que haja transformações no âmbito hospitalar e em outras partes do sistema de saúde. Uma mudança importante é desenvolver práticas humanizadas de acolhimento de pessoas na atenção hospitalar, tais como a incorporação da presença de acompanhantes e familiares na internação.

## QUESTÃO 12

Para cada grupo de doenças ou de eventos de interesse em saúde pública, existem sistemas que coletam dados e disponibilizam informações com o intuito de contribuir para a definição de prioridades nos diferentes níveis de atenção. Em razão da relevância para a Vigilância Epidemiológica, alguns sistemas de informação em saúde se destacam.

A esse respeito, assinale a alternativa que corresponde ao objetivo do sistema de informação em saúde indicado.

- (A) Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) – coleta dados da declaração de nascido vivo sobre a gestação, o feto, o parto, a criança nascida e a atenção pré-natal.
- (B) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) – contempla o registro das informações produzidas por todas as equipes de atenção básica. É composto por dois sistemas de captação de dados: Coleta de Dado Simplificado (CDS) e Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).
- (C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) – coleta dados sobre doenças de notificação compulsória. Perpassa todas as esferas de governo, alimentando bancos de dados municipal, estadual e nacional.
- (D) Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SUS) (SIA/SUS) – coleta dados cuja fonte é a declaração de óbito.
- (E) Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (Sisab) – contempla atendimentos e procedimentos ambulatoriais.

## QUESTÃO 13

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas visa a garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e a transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura.

Assinale a alternativa que contempla uma diretriz da Política Nacional de Atenção à saúde dos povos indígenas.

- (A) Controle social.
- (B) Disponibilidade de serviços, recursos humanos e infraestrutura.
- (C) Relações sociais entre os diferentes povos indígenas do território e a sociedade regional.
- (D) Atenção básica realizada por intermédio dos agentes indígenas de saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes multidisciplinares periodicamente, conforme planejamento das suas ações.
- (E) Os serviços de saúde e as comunidades terão outra instância de atendimento, que serão denominados Pólos-Base.

## QUESTÃO 14

A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) possui o objetivo de promover a saúde das populações do campo e da floresta por meio de ações e iniciativas que reconheçam as especificidades de gênero, geração, raça/cor, etnia e orientação sexual, visando ao acesso aos serviços de saúde, à redução de riscos e agravos à saúde decorrentes dos processos de trabalho e das tecnologias agrícolas e à melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade de vida. Na elaboração de planos, programas, projetos e ações de saúde, alguns princípios e diretrizes são observados.

Assinale a alternativa que apresenta um princípio e (ou) diretriz referente à PNSIPCF.

- (A) Promover a inclusão, no Plano Nacional de Saúde, das metas e prioridades para a organização das ações de saúde para as populações do campo e da floresta.
- (B) Promover a inclusão da PNSIPCF no Plano Municipal de Saúde.
- (C) Produzir dados estratificados a respeito das populações do campo e da floresta e manter atualizados os sistemas nacionais de informação em saúde.
- (D) Valorizar práticas e conhecimentos tradicionais, com a promoção do reconhecimento da dimensão subjetiva, coletiva e social dessas práticas e a produção e reprodução de saberes das populações tradicionais.
- (E) Garantir o acesso aos serviços de saúde com resolutividade, qualidade e humanização, incluindo as ações de atenção, as especializadas de média e alta complexidade e as de urgência e de emergência, de acordo com as necessidades e demandas apontadas pelo perfil epidemiológico da população atendida.

## QUESTÃO 15

No Sistema Único de Saúde, há um princípio o qual afirma que deve ser garantido ao usuário, o acesso a todos os níveis de atenção, tendo prioridade as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

O princípio que retrata essa informação é o da

- (A) equidade.
- (B) regionalização.
- (C) universalidade.
- (D) hierarquização.
- (E) integralidade.

Área livre

## QUESTÃO 16

Segundo a Lei nº 8.080/1990, título III-A, art. 26-A, a tele-saúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal, e deve obedecer a determinados princípios, entre os quais é correto citar

- (A) regionalização.
- (B) dignidade e valorização do profissional de saúde.
- (C) promoção da equidade de acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde.
- (D) igualdade de assistência à saúde.
- (E) organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

## QUESTÃO 17

O atual modelo de prestação de serviços de saúde do Brasil – o Sistema Único de Saúde (SUS) – é resultado de um processo histórico conhecido com o movimento sanitário brasileiro, intensificado a partir das décadas de 1970 e de 1980.

A respeito desse processo histórico, assinale a alternativa correta.

- (A) A criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, configurou uma medida de racionalização administrativa sem alterar a tendência do período anterior de expansão dos serviços, em particular da assistência médica e da cobertura previdenciária.
- (B) O Movimento Sanitário Brasileiro teve como ponto alto de sua articulação a VI Conferência Nacional de Saúde em 1984.
- (C) As pressões populares e do movimento sanitário não conseguiram avanço no campo da extensão de cobertura em função do modelo político vigente.
- (D) O SUS foi proposto com uma nova fase da política brasileira, estabelecida com a revolução de 1988.
- (E) Os indicadores de saúde da época do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) melhoraram.

Área livre

## QUESTÃO 18

As atividades da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) têm como referência o conceito de saúde, tal como o concebe a Organização Mundial de Saúde (OMS) – “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade” – e o preceito constitucional de reconhecer a saúde como um “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da Constituição Federal de 1988).

Assinale a alternativa que apresenta um objetivo da CNDSS.

- (A) Manter o portal referente aos Determinantes Sociais de Saúde (DSS), o qual, além de informações acerca das atividades da CNDSS, inclui dados, informações e conhecimentos a respeito dos DSS existentes nos sistemas de informação e na literatura mundial e nacional.
- (B) Apresentar recomendações concretas de políticas, programas e intervenções para o combate às iniquidades de saúde geradas pelos DSS.
- (C) Apoiar o desenvolvimento de políticas e programas para a promoção da equidade em saúde.
- (D) Atuar nas condições materiais e psicossociais nas quais as pessoas vivem e trabalham, buscando assegurar melhor acesso a água limpa, tratamento de esgoto, habitação adequada, alimentos saudáveis, serviços de saúde e educação de qualidade.
- (E) Expressar, com maior ou menor nível de detalhe, o conceito, atualmente bastante generalizado, de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com a respectiva situação de saúde.

## QUESTÃO 19

A epidemiologia busca respostas para questões relacionadas com os diversos agravos à saúde. Essa atividade deve ser norteadada por uma série de etapas que permitirão, a quem estiver desenvolvendo a pesquisa, obter informações que o auxiliem na tomada de decisões. Assim, as decisões clínicas, sociais, ou mesmo políticas relacionadas com a saúde das populações devem ser fundamentadas em uma investigação científica rigorosa, de modo a maximizar os benefícios e minimizar custos/agravos.

Com base nos delineamentos de estudo dentro da epidemiologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Avaliar tendências temporais na mortalidade decorrente de afogamento nas cinco regiões do Brasil, de 2010 a 2020, é um estudo do tipo transversal.
- (B) Estudos observacionais são aqueles que têm por base a observação da magnitude da ocorrência de determinados eventos com interferência direta sobre o objeto de estudo.
- (C) Estudos observacionais podem ser categorizados como descritivos e analíticos. Os analíticos também se subdividem em estudos ecológicos e experimentais.
- (D) Os estudos epidemiológicos são, geralmente, classificados como estudos observacionais.
- (E) Os estudos de coorte normalmente apresentam curta duração e baixo custo.

## QUESTÃO 20

Educação na saúde consiste na produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e ao desenvolvimento para a atuação em saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes didáticas e orientação curricular. A educação no século 20 tornou-se permanente e social, e as ideias universalmente difundidas entre elas é a de que não há idade para se educar, de que a educação se estende pela vida e ela não é neutra, mas engajada. Para tanto, há duas modalidades de educação no trabalho em saúde: educação continuada e educação permanente.

Com relação a essas duas modalidades de educação no trabalho em saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A educação permanente envolve as atividades de ensino após a graduação, possui duração definida e utiliza metodologia tradicional, tais como as pós-graduações.
- (B) O desafio da educação permanente é estimular o desenvolvimento da consciência nos profissionais, relacionada ao respectivo contexto, pela própria responsabilidade em seu processo de capacitação. Tem como cenário o próprio espaço de trabalho, no qual o pensar e o fazer são insumos fundamentais do aprender e do trabalhar.
- (C) A educação permanente caracteriza-se por alternativas educacionais mais centradas no desenvolvimento de grupos profissionais, seja por meio de cursos de caráter seriado, seja por meio de publicações específicas em determinado campo.
- (D) A educação continuada consiste em ações educativas embasadas na problematização do processo de trabalho em saúde e que tenham como objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, tomando como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, a reorganização da gestão setorial e a ampliação dos laços da formação com o exercício do controle social em saúde.
- (E) A educação continuada estrutura-se a partir de dois elementos: as necessidades do processo de trabalho e o processo crítico como inclusivo ao trabalho.

Área livre

### QUESTÃO 21

No que concerne à vacina contra o papilomavírus humano (HPV), assinale a alternativa correta.

- (A) Mulheres e homens que vivem com HIV têm contraindicação para a vacina do HPV.
- (B) Vítimas de abuso sexual entre 9 e 14 anos de idade devem tomar o esquema completo de três doses da vacina, independentemente da situação vacinal anterior.
- (C) A vacina contra o HPV é considerada prevenção primária para câncer de colo do útero.
- (D) Atualmente a vacina previne infecções por todos os tipos de HPV.
- (E) Adultos entre 25 e 35 anos de idade devem tomar o esquema vacinal de três doses com intervalo de seis meses.

### QUESTÃO 22

A Resolução Cofen nº 543/2017 revisa e define diretrizes para determinar o número de profissionais de enfermagem necessários nas instalações onde atividades de enfermagem são realizadas.

Com base nessa resolução, assinale a alternativa correta.

- (A) Ao quadro de profissionais de enfermagem de unidades assistenciais, composto por 50% ou mais de pessoas com idade superior a 50 anos, deve ser acrescido 10% de profissionais do setor.
- (B) A norma estabelece que o quantitativo de enfermeiros para o exercício de atividades gerenciais deve ser calculado na proporção de um profissional para cada 20 enfermeiros lotados na unidade gerenciada.
- (C) A Central de Material Esterilizado (CME) deve contar com um profissional enfermeiro em todos os turnos, inclusive no noturno, mesmo que não seja rotina o processamento de material nesse período.
- (D) Ao enfermeiro gestor da unidade cabe privativamente o registro diário da classificação dos pacientes segundo o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), para subsidiar a composição do quadro de enfermagem para as unidades de internação.
- (E) Em razão do baixo índice de morbidade característico do setor, no alojamento conjunto, o binômio mãe/filho deve ser classificado, no mínimo, como cuidado mínimo.

Área livre

### QUESTÃO 23

Uma paciente de 29 anos de idade compareceu ao centro de saúde para consulta de enfermagem sem queixas ginecológicas. Apresentou ao enfermeiro o resultado de exame citopatológico realizado em consulta anterior.

#### Exame citopatológico

**Adequação da amostra:** satisfatória

**Epitélios representados:** escamoso e glandular

**Microbiologia:** *Candida ssp* e *Lactobacillus sp*

**Conclusão:** lesão intraepitelial de alto grau (HSIL)

Os resultados de análises citopatológicas mostraram-se anormais e demandam etapas suplementares para diagnóstico, tratamento e acompanhamento adequados.

Com base no resultado do exame citado no caso em referência, assinale a alternativa correta.

- (A) O encaminhamento para colposcopia deverá ser realizado em caso de exame citopatológico com adequação da amostra insatisfatória.
- (B) As mulheres que apresentarem laudo citopatológico de lesão intraepitelial de alto grau deverão fazer a repetição da citologia para confirmação do diagnóstico.
- (C) O epitélio glandular e o escamoso revestem a endocérvice.
- (D) A *Candida ssp* é natural na microflora vaginal. Quando ocorre multiplicação controlada e na ausência de sinais e sintomas associados, não há tratamento recomendado.
- (E) Caso a lesão intraepitelial de alto grau seja confirmada, deve-se prosseguir com acompanhamento semestral por meio do exame colposcópico por até dois anos.

### QUESTÃO 24

Um paciente de 41 anos de idade sofreu um acidente de moto e foi socorrido pela equipe de atendimento pré-hospitalar. Ele apresentava abertura ocular ao estímulo de pressão, resposta verbal confusa, e resposta motora com extensão anormal. Ao exame físico, apenas uma das pupilas estava fotorreagente.

Qual é o valor da escala de coma de Glasgow com resposta pupilar (ECG-P) para esse paciente?

- (A) 12
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 11
- (E) 10

Área livre

## QUESTÃO 25

A esquizofrenia tem sido descrita como uma enfermidade complexa e multifatorial, que abrange transtornos com etiologias diversas. As primeiras manifestações da doença normalmente surgem no final da adolescência e início da vida adulta.

Acerca da esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por sintomas leves e curso de curto prazo; dessa forma, nem sempre envolve deterioração psíquica progressiva.
- (B) É diagnosticada quando o paciente atende aos critérios de um transtorno ansioso ou depressivo delirante.
- (C) A detecção precoce da doença e o tratamento agressivo do primeiro episódio psicótico não estão associados a melhores resultados do tratamento em longo prazo.
- (D) A intensidade dos sintomas tende a aumentar com a idade, levando o paciente à deterioração do funcionamento social e ocupacional ao longo dos anos.
- (E) O tipo paranoide caracteriza-se por delírios e alucinações grandiosos e persecutórios (sensação de estar sendo espiado) e, ocasionalmente, religiosidade excessiva ou comportamento hostil.

## QUESTÃO 26

A escala de dor neonatal (*neonatal infant pain scale – NIPS*) é amplamente utilizada para avaliar a dor em recém-nascidos (RN). Essa escala avalia indicadores comportamentais e fisiológicos para determinar o nível de dor que um neonato pode estar experimentando. Sinais de tranquilidade, relaxamento e calma *versus* sinais de choro, rigidez/flexão muscular e agitação são identificados por meio da observação da expressão facial, do choro, da respiração, dos braços, das pernas e do estado de alerta/consciência. Para cada variável dessas, há dois itens que devem ser pontuados em 0 ou 1 (exceto a variável choro, que possui três itens que devem ser pontuados entre 0 e 2). A pontuação da escala varia de 0 a 7 pontos, considerando-se dor com pontuação superior a 3.

Com relação à escala de dor neonatal NIPS, assinale a alternativa correta.

- (A) A avaliação de neonatos em uso de tubo endotraqueal e dos que estão respirando em ar ambiente deve ocorrer de forma igualitária.
- (B) Um RN que apresenta choro forte persistente, agitação motora e movimenta os membros continua e rapidamente tem pontuação maior que 3.
- (C) O estado de sono não influencia na pontuação final.
- (D) Na postura corporal, a flexão ou extensão dos membros é indicador com pontuação igual a zero.
- (E) Mesmo RN neurologicamente comprometidos ou farmacologicamente paralisados são capazes de exibir respostas comportamentais à dor e podem ser avaliados.

Área livre

## QUESTÃO 27

Após o nascimento de um bebê, a avaliação do estado de saúde imediato no primeiro e no quinto minuto de vida é realizada utilizando-se o índice Apgar.

No primeiro minuto de vida, um bebê apresentou uma coloração de pele totalmente cianótica, choro vigoroso e careta, movimentos ativos dos membros, resistência moderada quando manipulado e uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Ao ser reavaliado no quinto minuto de vida, estava rosado e com cianose nas extremidades dos membros superiores e inferiores.

Com base nessas características, qual seria a pontuação Apgar atribuída a esse recém-nascido?

- (A) 9 e 10
- (B) 8 e 9
- (C) 7 e 8
- (D) 5 e 8
- (E) 8 e 10

## QUESTÃO 28

Quanto às interações e aos cuidados na administração de sulfato ferroso, assinale a alternativa correta.

- (A) Indica-se o uso desse medicamento antes das refeições, pois, se for tomado com alimentos, ocorrerá redução da absorção do fármaco de 30% a 50%.
- (B) O sulfato ferroso também pode ser chamado de ferro elementar.
- (C) É indicado de forma profilática para mulheres durante a gestação e, para as crianças, nos primeiros anos de vida.
- (D) É indicado para a profilaxia de anemia falciforme.
- (E) Crianças em aleitamento materno exclusivo recebem a suplementação com sulfato ferroso em idade anterior às que sofreram desmame precoce.

Área livre

## QUESTÃO 29

A terapia de nutrição parenteral (NP) é uma opção para indivíduos cujo objetivo nutricional não pode ser alcançado por meio da nutrição via enteral. A NP é caracterizada como uma mistura ou emulsão composta essencialmente por glicídios, aminoácidos, lipídios, vitaminas, água, eletrólitos e sais minerais e deve ser administrada por via intravenosa.

A respeito das características da administração da NP, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando indicada por períodos superiores a 15 dias, a NP deve ser infundida por via exclusiva e prioritariamente por cateter venoso periférico em razão do menor risco de infecção.
- (B) A prescrição da NP é individualizada e, por isso, as complicações que podem surgir durante a administração não incluem distúrbios metabólicos.
- (C) A NP é indicada para pacientes com limitação para dieta enteral transitória e deve permanecer por curto período (menor que sete dias).
- (D) A preferência de escolha do sítio de inserção da NP segue a seguinte ordem: veia femoral, subclávia e jugular, definida pelo local do menor ao maior risco de contaminação.
- (E) A administração da NP é do tipo contínua, via bomba de infusão, em 24 horas, com fluxo constante, sem interrupção.

## QUESTÃO 30

Com base nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria (2022) para reanimação neonatal, assinale a alternativa que descreve a sequência adequada de intervenções durante o processo de reanimação de recém-nascido (RN) com idade gestacional  $\geq 34$  semanas.

- (A) Espera-se que, entre 5 e 10 minutos de vida, o neonato estabilizado apresente  $\text{SatO}_2 = 100\%$ .
- (B) A manutenção da temperatura não é uma intervenção prioritária na reanimação neonatal, podendo ser postergada para depois da estabilização do neonato.
- (C) Todos os neonatos devem passar por aspiração da boca e das narinas no momento em que são posicionados no berço aquecido antes da estabilização.
- (D) O RN que passou pelos passos iniciais de estabilização e avaliação, mostrou  $\text{FC} = > 100$  bpm e respiração regular, sempre que possível, ainda na sala de parto, colocar em contato pele a pele com a parturiente.
- (E) O oxímetro deve ser posicionado em membro inferior esquerdo para monitorizar a  $\text{SatO}_2$  pré-ductal.

Área livre

## QUESTÃO 31

No contexto da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em adultos, a administração de medicamentos desempenha um papel crucial. Com base nas diretrizes mais recentes, no que se refere às drogas utilizadas na RCP, assinale a alternativa correta.

- (A) A amiodarona é o fármaco de escolha como agente antiarrítmico durante a RCP, sendo administrada preferencialmente por via intravenosa na dose inicial de 300 mg, seguida por 150 mg se necessário.
- (B) A administração de atropina é recomendada como primeira linha de tratamento para bradicardia sintomática durante a RCP, com uma dose inicial de 1 mg por via intravenosa.
- (C) O uso de bicarbonato de sódio é rotineiro durante a RCP para correção da acidose metabólica, sendo administrado na dose de 1 mEq/kg.
- (D) A epinefrina é administrada preferencialmente por via intramuscular na dose de 1 mg a cada três a cinco minutos durante a RCP, mesmo em casos de assistolia.
- (E) O uso de vasopressina foi totalmente abandonado nas diretrizes atuais de RCP, sendo substituído exclusivamente pela epinefrina como agente vasoativo de escolha.

## QUESTÃO 32

A admissão de um paciente na unidade de terapia intensiva (UTI) envolve complexidade e ética, muitas vezes implicando discussões entre equipe médica, pacientes e familiares. Os critérios de admissão apoiam-se basicamente em dois modelos: um embasado nas funções orgânicas e outro nas prioridades de atendimento. A Resolução nº 2.156/2026 CFM define os critérios de admissão por prioridade de acordo com a condição do paciente.

Acerca da admissão de pacientes em UTI, assinale a alternativa correta.

- (A) Os pacientes classificados como prioridade 1 devem prioritariamente ser admitidos em unidades de cuidados paliativos.
- (B) A Regulação de Leitos de UTI do Sistema Único de Saúde é responsável pela distribuição de pacientes entre as unidades intensivas da Rede, seguindo a ordem de solicitação do leito, sem classificação por prioridade.
- (C) Pacientes classificados como prioridade 5 devem prioritariamente ser admitidos em unidades de cuidados intermediários.
- (D) As necessidades de tratamento específicas de um paciente, por exemplo, com nefropatia e necessidade de diálise não influenciam no tempo de espera por leito, pois todas as UTI têm suporte dialítico.
- (E) Pacientes com baixa probabilidade de recuperação e limitação de intervenção terapêutica não têm prioridade na admissão em UTI.

Área livre

### QUESTÃO 33

A gasometria arterial é uma amostra de sangue arterial, que é coletada e analisada para ajudar a determinar a qualidade e extensão da troca gasosa pulmonar e do equilíbrio acidobásico.

PaO<sub>2</sub>: 80 mmHg  
SatO<sub>2</sub>: 95%  
pH: 7,30  
PaCO<sub>2</sub>: 55 mmHg  
HCO<sub>3</sub>: 25 mEq/L

De acordo com a interpretação dos valores apresentados, assinale a alternativa correta.


- (A) Alcalose compensada
- (B) Alcalose respiratória
- (C) Acidose metabólica
- (D) Alcalose metabólica
- (E) Acidose respiratória

### QUESTÃO 34

Em relação às vias de administração de medicamentos, é correto afirmar que a via

- (A) intramuscular comporta quantidade restrita de volume, tendo como limite máximo 0,5 mililitros.
- (B) intramuscular é de absorção lenta, através dos capilares, de forma contínua e segura.
- (C) subcutânea é considerada de absorção muito lenta, utilizada principalmente na administração da vacina.
- (D) retal protege os fármacos suscetíveis da inativação gastrointestinal e hepática, pois somente 50% do fluxo venoso retal têm acesso à circulação porta.
- (E) transdérmica é utilizada para tratamento local.

### QUESTÃO 35



Um paciente de 35 anos de idade sofreu um acidente de carro, com capotamento. Apresentou traumatismo raquimedular e lesão torácica com conseqüente hemotórax. Foi realizada uma cirurgia (artrodese) e colocado um dreno de tórax à esquerda. O paciente encontra-se em segundo dia de pós-operatório, acamado. Ao exame físico, verificam-se tórax plano, expansibilidade diminuída à esquerda, ausculta respiratória com presença de crepitações finas, percussão com som submaciço, ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular e presença de primeira e segunda bulhas, normofonéticas.

No que se refere à manutenção do dreno de tórax pela equipe de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) A troca do dreno de tórax deverá ser realizada de forma rápida, com o paciente em inspiração profunda e com o *clamp* aberto para evitar retorno do conteúdo para a cavidade torácica.
- (B) Deve-se encher o frasco coletor (ou câmara) em nível apropriado, até que o final da haste esteja totalmente imerso e próximo ao fundo do frasco.
- (C) O enfermeiro deverá transportar o paciente com dreno de tórax sem pinçar o sistema, e também deverá mantê-lo abaixo do ponto de inserção do dreno no tórax do paciente.
- (D) Fixar a extensão do dreno na cama do paciente melhora a estabilização do dispositivo.
- (E) Em caso de coágulos retidos no sistema, é contraindicada a realização de ordenha para a sua eliminação.

### QUESTÃO 36

Um paciente de 20 anos de idade foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência após acidente automobilístico, apresentando traumatismo abdominal fechado. No local do acidente, ele foi encontrado lúcido, sudoreico, hipocorado, taquicárdico, com PA = 90 mmHg x 50 mmHg, FC = 120 bpm e FR = 25 irpm. Ele apresentava hematomas nos flancos abdominais e ao redor do umbigo e queixava-se de sede. Foi aplicado o mnemônico Sampla. Ao chegar ao hospital, foi reposto volume com ringer lactato. Após avaliação adequada, indicou-se a abordagem cirúrgica laparotomia exploradora.

Com base nesse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) No centro cirúrgico, o paciente deverá ser submetido a uma laparotomia exploratória por causa da instabilidade hemodinâmica, com o objetivo de explorar a cavidade abdominal para verificar possíveis lesões abdominais e focos de sangramento.
- (B) Após a administração do bicarbonato de sódio, foram encontrados nos parâmetros da gasometria arterial: PH = 7,14; PaCO<sub>2</sub> = 21 mmHg; HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> = 7mEq/L; PaO<sub>2</sub> = 98 mmHg. Esses parâmetros indicam uma acidose respiratória parcialmente compensada.
- (C) Considerando os sinais e sintomas apresentados pelo paciente na cena do trauma, infere-se que ele apresentava sintomatologia compatível com choque cardiogênico.
- (D) O paciente deverá aguardar pelo menos duas horas antes de ser encaminhado para o centro cirúrgico a fim de que se complete o esvaziamento gástrico naturalmente antes da cirurgia.
- (E) O método mnemônico Sampla pode ser utilizado para guiar sua entrevista durante a avaliação primária do paciente.

Área livre

## QUESTÃO 37

Um paciente de 41 anos de idade, cantor, foi socorrido e levado ao hospital, pois, no decorrer do *show* de ano novo, houve um acidente durante a queima de fogos de artifício, que provocaram queimadura sob o nariz e boca dele na região anterior do tórax e no membro superior direito, com lesão profunda, regiões esbranquiçadas, calor e rubor. O paciente nega dor.

Considerando o caso apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) De acordo com as características apresentadas nesse caso, o paciente apresenta queimadura de grau 2.
- (B) Deve-se evitar a suplementação com oxigênio em razão de possível lesão inalatória.
- (C) Deve-se evitar a realização de limpeza na região exposta por causa do risco de agravar a lesão provocada pela queimadura.
- (D) Em virtude do quadro desse paciente, é necessário iniciar reposição volêmica com acessos calibrosos e instalar cateter vesical de demora para controle hídrico.
- (E) A extensão da queimadura pode ser classificada em 9% da superfície corporal.

## QUESTÃO 38

Uma jovem de 22 anos de idade chegou ao pronto-socorro após ser vítima de violência sexual, relatando abuso com exposição a material biológico do agressor, ocorrido há aproximadamente seis dias. Nega exposição a risco anteriormente. O médico de plantão, ao avaliar a paciente, decidiu iniciar a profilaxia pós-exposição (PEP) para prevenir a infecção pelo HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Considerando o período entre a exposição e o atendimento na unidade de urgência, assinale a alternativa que apresenta a terapia indicada para essa paciente.

- (A) Profilaxia com antirretrovirais (ARV)
- (B) Profilaxia medicamentosa de ISTs
- (C) Anticoncepção de emergência com levonorgestrel
- (D) Profilaxia medicamentosa para hepatite B
- (E) Imunização para tríplice viral

## QUESTÃO 39

Um paciente recebeu a prescrição de 1 g de ceftriaxona diluída em 100 mL de soro fisiológico, a ser administrada em 30 minutos. A embalagem do medicamento informa que a ceftriaxona deve ser diluída em 10 mL de diluente para obter uma concentração de 100 mg/mL. Qual deve ser a taxa de infusão em mL/min para atender a essa prescrição?

- (A) 33 mL/min
- (B) 50 mL/min
- (C) 60 mL/min
- (D) 75 mL/min
- (E) 100 mL/min

## QUESTÃO 40

No que se refere ao esquema vacinal para gestantes, é fundamental considerar a proteção tanto da mãe quanto do recém-nascido. Com base nas recomendações vigentes, assinale a alternativa correspondente às vacinas indicadas durante o período gestacional.

- (A) A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) deve ser evitada durante a gestação em razão do risco de complicações fetais.
- (B) A vacina contra a influenza (gripe) não é recomendada para gestantes, pois elas não compõem o grupo de risco prioritário.
- (C) A vacina contra hepatite B não é necessária ao longo da gestação, visto que a transmissão vertical é rara e ocorre principalmente durante o parto.
- (D) A vacina contra a difteria, tétano e coqueluche (dTpa) é indicada apenas após o parto, não sendo necessária no decorrer da gestação.
- (E) A imunização contra o papilomavírus humano (HPV) é indicada durante a gestação e deve ser tomada em dose única no primeiro trimestre.


## QUESTÃO 41

Com base nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 2020, assinale a alternativa correta.

- (A) A monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) é contraindicada para o diagnóstico de hipertensão arterial.
- (B) A automedida da pressão arterial realizada com equipamento automático do próprio paciente apresenta limitações e não é recomendada.
- (C) A pressão arterial sistólica entre 120 mmHg e 129 mmHg e a pressão arterial diastólica entre 80 mmHg e 84 mmHg são classificadas como pressão arterial ótima para indivíduos maiores de 18 anos de idade.
- (D) A pressão arterial deve ser medida nos dois braços na primeira avaliação do paciente, porém não é recomendado realizar de forma simultaneamente.
- (E) Nos hipertensos de risco cardiovascular baixo ou moderado, a meta de tratamento é alcançar valores inferiores a PA = 140 mmHg x 90 mmHg.

Área livre

## QUESTÃO 42



A pressão arterial invasiva (PAI) é um método utilizado para monitorar a pressão arterial diretamente no sistema arterial do paciente. Consiste na introdução de um catéter em uma artéria por punção percutânea direta ou através de dissecação e tem como objetivo principal o fornecimento de medidas contínuas e precisas da pressão arterial, permitindo uma avaliação mais acurada da perfusão tecidual e uma resposta rápida a alterações hemodinâmicas em pacientes críticos. Esse método é frequentemente empregado em ambientes como unidades de terapia intensiva (UTI) e salas cirúrgicas, oferecendo uma monitorização mais detalhada em comparação com métodos não invasivos.

A respeito da PAI, assinale a alternativa correta.

- (A) É vedada ao enfermeiro a punção arterial para a instalação de cateter intra-arterial para a monitorização da PAI.
- (B) O transdutor deve ser posicionado no nível zero (na altura da linha axilar média).
- (C) O processo de punção e instalação da PAI é considerado um procedimento limpo e pode ser realizado com luvas de procedimento.
- (D) Não é recomendada a verificação da permeabilidade do sistema por meio da lavagem do sistema.
- (E) O membro onde a punção se localiza deve ficar imobilizado para que haja estabilidade da onda no monitor multiparamétrico.

## QUESTÃO 43

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa transmitida pelo *Mycobacterium tuberculosis*, o bacilo de Koch.

Um paciente com 51 anos de idade foi admitido na clínica médica com diagnóstico de tuberculose pulmonar resistente. Sabe-se que a equipe de enfermagem deve estar atenta a alguns cuidados específicos relacionados à transmissão dessa patologia.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente deverá usar a máscara N-95 durante o transporte nos corredores do hospital, quando for realizar exames ou no caso de transferência para outro setor.

- (B) O paciente deverá permanecer em um quarto privativo e com a porta aberta para ventilação do ambiente.
- (C) O paciente poderá ser internado em quarto coletivo, desde que a distância mínima entre os dois leitos seja de um metro.
- (D) O profissional de saúde, quando for prestar assistência ao paciente, deverá realizar a higiene das mãos antes e após o contato e fazer uso da máscara N-95.
- (E) Qualquer familiar ou acompanhante que permanecer nas enfermarias de isolamento respiratório ao lado do paciente com tuberculose deverá utilizar máscaras do tipo cirúrgicas comuns.

## QUESTÃO 44

Durante uma consulta de enfermagem em um centro de saúde, o paciente relatou dormência e formigamento persistentes em algumas áreas da pele, além de uma mancha clara com perda de sensibilidade em parte do corpo. A enfermeira, ao suspeitar de hanseníase, realizou uma série de perguntas e exames. Com base nas ações no decorrer dessa consulta, assinale a alternativa correta.

- (A) A enfermeira não precisa realizar testes específicos, pois os sintomas não são característicos de hanseníase.
- (B) A enfermeira deve encaminhar o paciente imediatamente a um dermatologista para realização dos testes diagnósticos.
- (C) A hanseníase é uma doença altamente contagiosa, portanto a enfermeira deve usar medidas de precaução rigorosas, como capote, máscara e luvas, ao realizar o exame físico.
- (D) O tratamento para hanseníase deve ser iniciado imediatamente sem a necessidade de confirmação diagnóstica.
- (E) A enfermeira pode realizar o teste da sensibilidade térmica para auxiliar na avaliação da perda de sensibilidade na área afetada.

## QUESTÃO 45

As áreas hospitalares são classificadas como críticas, semicríticas e não críticas de acordo com o risco para transmissão de infecções, determinado com base nas atividades desenvolvidas e (ou) no perfil dos pacientes atendidos em cada local, de modo que o processo de limpeza e desinfecção de superfícies esteja adequado ao risco.

Conforme essa classificação, assinale a alternativa que indica o serviço de saúde classificado como área crítica.

- (A) Internação em clínica médica
- (B) Centro obstétrico
- (C) Posto de enfermagem
- (D) Consultório
- (E) Unidade de hemodiálise

Área livre

## QUESTÃO 46

Segundo a Norma regulamentadora nº 6, que trata dos equipamentos de proteção individual (EPI), assinale a alternativa correta.

- (A) A compra do próprio EPI cabe ao trabalhador.
- (B) Ao trabalhador é facultativo o uso do EPI.
- (C) A organização não é obrigada a fazer a reposição imediata de EPI danificado ou extraviado.
- (D) A organização poderá realizar o registro de fornecimento de EPI descartável por sistema biométrico.
- (E) Não é de responsabilidade do empregador exigir o uso do EPI previamente fornecido ao trabalhador.

## QUESTÃO 47

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são abordagens terapêuticas que têm como objetivo prevenir agravos à saúde, a promoção e recuperação da saúde, enfatizando a escuta acolhedora, a construção de laços terapêuticos e a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece, de forma integral e gratuita, 29 procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) à população.

Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/p/pics#:~:text=As%20PICS%20fazem%20parte%20das,da%20autonomia%20e%20do%20autocuidado>>. Acesso em: 8 nov. 2023.

Assinale a alternativa que indica o procedimento que não faz parte da PICS

- (A) Constelação familiar
- (B) Aromaterapia
- (C) Plantas medicinais – fitoterapia
- (D) Reiki
- (E) Reeducação Postural Global

## QUESTÃO 48

No plantão noturno, uma enfermeira administrou uma medicação prescrita a um paciente, mas posteriormente percebeu que escolheu o medicamento errado em razão da semelhança das embalagens. O paciente sofreu um processo alérgico grave.

De acordo com a Classificação Internacional de Segurança do Paciente, assinale a alternativa correspondente ao conceito-chave que descreve a situação relatada.

- (A) Evento adverso
- (B) Incidente
- (C) Circunstância notificável
- (D) Risco
- (E) Acidente

Área livre

## QUESTÃO 49

No que se refere à higienização das mãos, assinale a alternativa correta.

- (A) Sabonete líquido e preparação alcoólica para a higiene das mãos devem ser utilizados concomitantemente.
- (B) Os sabonetes líquidos e antissépticos a serem aplicados nas mãos devem ter registro na Anvisa como saneantes, indicados para higienização da pele.
- (C) A higiene antisséptica das mãos é o ato de higienizar as mãos com água e sabonete comum, sob a forma líquida.
- (D) A preparação alcoólica para higienização das mãos sob a forma líquida deve conter álcool na concentração final entre 60 e 80%.
- (E) A higienização das mãos antes do uso de luvas é dispensável.

## QUESTÃO 50

*Near miss* (quase erro) é um termo amplamente utilizado na área de segurança do paciente para descrever eventos que quase resultaram em danos ao paciente, mas foram evitados por circunstâncias fortuitas ou intervenção oportuna.

Na assistência, é correto indicar a ocorrência de *near miss* quando

- (A) um paciente quase recebe um medicamento destinado a outra pessoa com um nome semelhante, mas antes de o profissional iniciar a infusão da medicação, ele inadvertidamente a recusa.
- (B) um paciente tiver sofrido uma queda no banheiro do hospital e fraturado o quadril.
- (C) a bolsa de sangue tiver sido conectada ao paciente errado e não tiver resultado em danos a sua saúde.
- (D) um paciente tiver recebido a dose incorreta de um medicamento e não tiver apresentado alterações clínicas e laboratoriais após o incidente.
- (E) o paciente tiver desenvolvido uma infecção hospitalar em razão da falta de práticas adequadas de higiene das mãos ou controle de infecções pelos profissionais de saúde.

Área livre

## QUESTÃO 51

Segundo o Nanda 2021-2023, o diagnóstico de “risco de lesão por pressão neonatal” tem o seguinte conceito: neonato suscetível a danos localizados na pele e (ou) tecido subjacente, como resultado de pressão ou pressão em combinação com cisalhamento, que pode comprometer a saúde.

Com base no conceito citado, assinale a alternativa que apresenta um fator risco.

- (A) Bolha cheia de sangue
- (B) Eritema
- (C) Área marrom localizada de pele intacta descolorida
- (D) Calor localizado em relação ao tecido circundante
- (E) Umidade excessiva

## QUESTÃO 52

A cassação do direito ao exercício profissional consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até 30 anos, a ser divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

RESOLUÇÃO COFEN nº 564/2017.

Disponível em: < <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-642017/>>.

Acesso em: 16 out. 2023, com adaptações.

A respeito das proibições no exercício da enfermagem, assinale a alternativa correspondente a um ato que resulte em cassação do exercício profissional.

- (A) Praticar, individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza contra pessoa, família, coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras.
- (B) Eximir-se da responsabilidade legal da assistência prestada aos pacientes sob seus cuidados, realizados por alunos e (ou) estagiários sob sua supervisão e (ou) orientação.
- (C) Delegar atribuições dos profissionais de enfermagem, previstas na legislação, para acompanhantes e (ou) responsáveis pelo paciente.
- (D) Permitir que o próprio nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição, ou estabelecimento congênere, quando nela não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação.
- (E) Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações acerca do exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem e (ou) pela Comissão de Ética de Enfermagem.

Área livre

## QUESTÃO 53

De acordo com a Resolução Cofen nº 564/2017, que trata do Código de Ética em Enfermagem, no que se refere ao consentimento do paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) A comunicação externa, para os órgãos de responsabilização criminal, de casos de violência contra idosos somente é permitida mediante consentimento do paciente.
- (B) Deve-se manter sigilo com relação ao fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto em casos de consentimento verbal da pessoa envolvida.
- (C) A prática profissional estará assegurada quando não houver capacidade de decisão por parte do paciente assistido, ou na ausência do respectivo representante legal ou responsável.
- (D) Não é permitido executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante ou responsável legal, exceto em urgências.
- (E) A obtenção do consentimento do paciente é uma formalidade burocrática que não necessariamente requer comunicação prévia a respeito dos procedimentos de saúde a serem realizados.

## QUESTÃO 54

Uma paciente de 27 anos de idade compareceu ao centro de saúde para consulta ginecológica de rotina, mas não apresentou queixas. É solteira, nunca teve relações sexuais e nega tratamento prévio de corrimentos vaginais. No Brasil, o exame citopatológico, também chamado esfregaço cervicovaginal ou exame de Papanicolau, é o método de escolha para o rastreamento do câncer de colo uterino. A esse respeito, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, assinale a alternativa que indica a forma como a orientação para a realização do citado exame na paciente desse caso clínico deve ser feita.

- (A) O referido exame deve ser feito a cada um ano, após dois exames semestrais com resultados negativos.
- (B) Esse exame deve ser semestral, independentemente de sintomatologia ginecológica.
- (C) A paciente deve ser orientada de que não preenche os critérios para realização do rastreamento do câncer de colo uterino.
- (D) O exame mencionado precisa ser realizado a cada dois anos, após dois exames anuais com resultados negativos.
- (E) O exame apresentado precisa ser feito a cada três anos, após dois exames anuais consecutivos com resultados negativos.

Área livre

## QUESTÃO 55

Segundo a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.173/2017, os procedimentos para determinação de morte encefálica (ME) devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentam coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinal e apneia persistente.

A respeito do diagnóstico da ME, assinale a alternativa correta.

- (A) São necessários dois exames clínicos realizados por um neurologista, que confirmem coma não perceptivo e ausência de função do tronco encefálico.
- (B) Uma das condições que o exame clínico deve evidenciar para a confirmação da ME é a ausência do reflexo de tosse.
- (C) A declaração de óbito terá data e hora da morte definida retrospectivamente com base no primeiro exame clínico que evidenciou o coma não perceptivo.
- (D) O exame que comprova a ausência de atividade encefálica é facultativo se os demais sinais clínicos determinantes para a ME estiverem presentes.
- (E) O paciente precisa estar sob uso de drogas sedativas ou depressoras do sistema nervoso central.

## QUESTÃO 56

A manutenção do potencial doador de órgãos após determinação da morte encefálica (ME) exige cuidados específicos com o intuito de manter a viabilidade dos órgãos a serem doados. A ME cursa com alterações fisiológicas e bioquímicas cujas repercussões podem afetar a função dos órgãos potencialmente disponíveis para a doação.

Para a manutenção da viabilidade dos órgãos do potencial doador, destaca(m)-se como intervenção a

- (A) transfusão contínua de hemácias.
- (B) infusão de drogas vasoativas em baixa dose.
- (C) manutenção da temperatura corpórea abaixo de 35 °C.
- (D) interrupção da infusão de dieta.
- (E) ventilação mecânica e a manutenção da pressão positiva final de expiração (PEEP) sempre baixa.

## QUESTÃO 57

O START (*simple triage and rapid treatment*) é um método de avaliação rápido e sistematizado pensado para incidentes com múltiplas vítimas. A classificação dos pacientes se dá por nível de prioridade e é realizada com base nas necessidades de cuidados e na chance de sobrevivência mediante a pronta avaliação da capacidade de deambulação, respiração, perfusão sanguínea e nível de consciência.

De acordo com o método START, um paciente adulto incapaz de deambular, com FR = 25 irpm, enchimento capilar ≤ 2 segundos, que obedece a comandos será classificado como

- (A) amarelo (pode aguardar atendimento).
- (B) vermelho (atendimento imediato/urgente).
- (C) verde (leve/prioridade mínima).
- (D) cinza (inviável).
- (E) preto (morto).

## QUESTÃO 58

Um paciente de 35 anos de idade, vítima de acidente automobilístico com consequente fratura fechada em fêmur direito, encontra-se sob observação em uma unidade de emergência. Após avaliação do membro e intervenção realizada pela equipe médica, foi instalado o aparelho gessado (tala gessada), que permanecerá no membro lesionado até a realização da cirurgia. Duas horas depois da intervenção, o paciente queixa-se de dor de intensidade 8 em uma escala de 0 a 10 no membro lesionado, apresenta PA = 150 mmHg x 100 mmHg, FR = 36 irpm, FC = 110 bpm e SatO<sub>2</sub> = 99%. Ao exame físico, mostrou-se lúcido, orientado em tempo e espaço, com comportamento autocentrado, fâcies de dor e sudoreico.

Para a principal queixa do paciente, a enfermeira da unidade elencou o diagnóstico de enfermagem, segundo o Nanda 2021-2023, como “dor aguda”.

Acerca do processo de enfermagem aplicado a esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico de enfermagem proposto pela enfermeira poderia ter como fatores relacionados sudorese, expressão facial de dor e alteração nos parâmetros fisiológicos (sinais vitais).
- (B) A enfermeira da unidade de emergência poderia determinar o seguinte resultado esperado para esse diagnóstico: “o paciente apresentará cicatrização óssea completa em até 24 horas”.
- (C) Deverá compor a prescrição de enfermagem relacionada a esse diagnóstico as seguintes intervenções: avaliar a perfusão periférica, temperatura e coloração da extremidade do membro em uso; e orientar o paciente para que o membro permaneça elevado.
- (D) A etiologia do diagnóstico de enfermagem “dor aguda”, nesse caso, pode ser apontada como agente de lesão física.
- (E) O diagnóstico de enfermagem correto para esse caso seria “dor crônica”, pois a queixa algica do paciente tem duração previsível superior a três meses.

Área livre

## QUESTÃO 59

A agitação psicomotora é descrita como um excesso de atividade motora e cognitiva associada a um estado subjetivo de tensão e ocorre durante episódios de crise de diferentes transtornos psiquiátricos.

Em relação à agitação psicomotora e ao papel da enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Iguala-se ao comportamento agressivo definido pela intenção ou pelo ato de causar dano físico a alguém.
- (B) A abordagem adequada, de forma evolutiva, perpassa pela aplicação da contenção física ou mecânica, farmacológica e, em último caso, das contenções verbais.
- (C) A contenção mecânica trata-se de intervenção que pode ser empregada por enfermeiro ou sob sua supervisão em conformidade com protocolos institucionais.
- (D) A contenção farmacológica deverá ser feita preferencialmente por via parenteral com o objetivo de induzir a sedação e (ou) o sono profundo.
- (E) Em casos de iminência de comportamento agitado, o paciente deve ser atendido por um único profissional de saúde preferencialmente sem o uso de jaleco.

## QUESTÃO 60

Uma paciente de 36 anos de idade, com ensino médio completo e parceiro fixo, procura atendimento no centro de saúde com queixa de corrimento vaginal amarelado em grande quantidade com odor fétido. Nega prurido. Utiliza somente método contraceptivo oral hormonal; não usa camisinha durante as relações sexuais. Ao exame físico, apresenta genitália externa íntegra, sem sinais flogísticos e higiene preservada. Ao exame especular, observam-se canal vaginal com presença de corrimento fluido, amarelado, colo do útero íntegro, coloração rósea, sem sinais de inflamação. A enfermeira realizou o teste de pH posicionando a fita sob a parede vaginal com resultado 5,0, e o teste de aminas (teste de Whuff) foi positivo.

O Ministério da Saúde por intermédio do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (PCDT-IST) preconiza a utilização do fluxograma para o manejo clínico de corrimentos vaginais.

Considerando esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A prescrição medicamentosa deverá ser realizada somente após a leitura do resultado do exame Papanicolau para identificação do antígeno causador da infecção.
- (B) Segundo o fluxograma, nesse caso, deve-se realizar o tratamento para os corrimentos vaginose bacteriana e tricomoníase.
- (C) O pH básico é característico de infecções por *Candida albicans*.
- (D) O corrimento vaginal é candidíase, e o tratamento medicamentoso deve ser realizado com miconazol creme vaginal.
- (E) Em caso de recorrência, o corrimento vaginal deve ser tratado tendo em mente a mesma posologia utilizada na primeira ocorrência.

# ATENÇÃO

**Aguarde a autorização do  
fiscal para iniciar a prova.**

Realização

**iades**

Instituto Americano de Desenvolvimento