



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DIVISÃO DE ENSINO
SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E
ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2024
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 02/2023



ODONTOLOGIA

Tipo
“D”

Data da prova:

Domingo, 03/12/2023

INSTRUÇÕES

- Você recebeu do fiscal:
 - 1 (um) caderno de questões da prova objetiva contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e
 - 1 (uma) folha de respostas personalizada da prova objetiva.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A paz do coração é o paraíso dos homens.

- Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha de respostas da prova objetiva.
- Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala.
- Você somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o caderno de prova no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao término do tempo destinado à realização da prova objetiva.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
- Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
- A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 10

QUESTÃO 1

¹ A lavradora Raimunda Ferreira de Oliveira, de 79 anos de idade, que nunca trabalhou com carteira assinada, lembra como era a saúde antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

⁴ — A gente tinha que pagar para ver o médico. Aqui, em Rosário — município maranhense —, tinha um médico ⁷ só e a gente ia na casa dele para ser atendida quando ⁸ acontecia alguma coisa.

Disponível em: <https://noticias.r7.com/saude/qualidade-de-atendimento-ainda-e-desafio-do-sus-19082013?utm_source=googleamp>. Acesso em: 11 nov. 2023, com adaptações.

Quanto aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A concordância verbal em “A gente tinha” (linha 5) está em desacordo com a norma-padrão.
- (B) O verbo “ver” (linha 5) tem, no texto, sentido que extrapola a percepção pela visão.
- (C) Na linha 6, o emprego de travessões após “Rosário” e “maranhense” marca o discurso direto.
- (D) O verbo “ter”, em “tinha um médico” (linha 6), apresenta sentido de “possuir”.
- (E) A inserção de vírgula após “só” (linha 7) comprometeria a correção gramatical do período.

QUESTÃO 2

¹ O modelo de atenção à saúde no Brasil resultou, desde o seu início, de trocas e apropriações de experiências entre europeus, índios e africanos, particularmente no que ⁴ tange à prática médica (PÓRTO, 2006). Com o processo de expansão marítima europeia, iniciado nos séculos 15 e 16, ocorreu um significativo aumento na circulação de ⁷ mercadorias e contatos entre os povos, mas também houve uma verdadeira “união microbiana” com um novo trânsito de doenças entre territórios distintos.

¹⁰ Com a chegada dos portugueses à Terra de Santa Cruz, um mundo novo e desafiante se formava em relação às enfermidades. Aqui, juntaram-se à malária, doença ¹³ tropical, até então desconhecida para os europeus, aquelas trazidas pelos colonizadores, como peste bubônica, cólera e varíola e, posteriormente, com a chegada dos africanos, a ¹⁶ filaríose e a febre amarela.

OLIVEIRA, André Luiz de. *História da saúde no Brasil: dos primórdios ao surgimento do SUS*.

Disponível em: <<https://facasc.emnuvens.com.br/ret/article/view/198>>. Acesso em: 14 nov. 2023, com adaptações.

Considerando as estruturas linguísticas e os sentidos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 11, a forma verbal “se formava” concorda com “desafiante”.
- (B) O uso do sinal indicativo de crase em “à saúde” (linha 1) e em “à malária” (linha 12) obedece à mesma regra gramatical.
- (C) Os novos contatos entre povos estão dissociados da propagação de doenças no Brasil.

- (D) O emprego de um par de vírgulas, em “desde o seu início” (linha 2), tem função de isolar elemento de natureza adverbial.
- (E) O uso do sinal indicativo de crase em “às enfermidades” (linha 12) justifica-se por uma exigência de natureza verbal.

QUESTÃO 3

¹ A diversidade racial, presente no Brasil desde a sua colonização, possibilitava um leque de opções de tratamentos, pois os índios, os colonizadores e ⁴ posteriormente os negros eram detentores de conhecimentos próprios para lidar com as enfermidades. Essas culturas, a partir de suas cosmovisões, ofereciam procedimentos ⁷ terapêuticos peculiares para as moléstias que ocasionalmente os acometiam.

Desse modo, rezas, feitiços, plantas e ervas nativas ¹⁰ eram utilizados rotineiramente por pajés, na população indígena, e por curandeiros, na população negra, únicas formas de acesso à saúde para a maioria da população.

¹³ Algumas técnicas foram introduzidas aos poucos. Para quem poderia custear, havia a figura do prático ou barbeiro, que utilizava procedimentos avançados para a ¹⁶ época, como sangria ou aplicação de sanguessugas, técnicas ¹⁷ utilizadas por médicos europeus.

OLIVEIRA, André Luiz de. *História da saúde no Brasil: dos primórdios ao surgimento do SUS*. Disponível em: <<https://facasc.emnuvens.com.br/ret/article/view/198>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

Acerca dos aspectos linguísticos, da pontuação e dos sentidos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O emprego de vírgulas para isolar “presente no Brasil desde a sua colonização” (linhas 1 e 2) tem função de marcar elemento de natureza adverbial.
- (B) Em “os acometiam” (linha 8), o pronome “os” se refere a “procedimentos terapêuticos peculiares” (linhas 6 e 7).
- (C) “Desse modo” (linha 9) pode ser substituído por **Assim** sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos do texto.
- (D) O emprego de um par de vírgulas para isolar a palavra “posteriormente” (linha 4) alteraria os sentidos do texto e comprometeria sua correção gramatical.
- (E) O uso de vírgula depois da palavra “barbeiro” (linha 15) marca a introdução de uma oração adjetiva restritiva.

Área livre

QUESTÃO 4

¹ Ao lado de desafios mais recentes, persistem questões relacionadas ao subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS), à precariedade dos vínculos de trabalho e à

⁴ necessidade de valorização dos trabalhadores através de planos de carreira adequados. Destaca-se também a

⁷ necessidade de propor diretrizes e ações para o conjunto das profissões relevantes para o SUS, inclusive no que se refere aos profissionais técnicos de nível médio.

Permanece ainda como desafio a aproximação entre a

¹⁰ academia e os serviços. As residências constituem um importante caminho para superar essa distância que historicamente preocupa os construtores do sistema de saúde

¹³ no Brasil.

Disponível em: <<https://agencia.fiocruz.br/resid%C3%A4ncias-s%C3%A3o-uma-modalidade-diferenciada-de-forma%C3%A7%C3%A3o>>. Acesso em: 15 nov. 2023, com adaptações.

No que diz respeito à concordância verbal e aos sentidos, seria mantida a correção gramatical e os sentidos do texto, caso

- (A) “persistem” (linha 1) fosse substituído por **persiste**.
- (B) “Destaca-se” (linha 5) fosse substituído por **Destacam-se**.
- (C) “no que se refere” (linha 7) fosse substituído por **no que tange**.
- (D) “Permanece” (linha 9) fosse substituído por **Permanecem**.
- (E) “preocupa” (linha 12) fosse substituído por **preocupam**.

QUESTÃO 5

¹ Propostas de mudanças na formação em saúde no Brasil vêm sendo discutidas desde o final da década de 1980, com a proposição do Sistema Único de Saúde (SUS).

⁴ Atualmente, essa discussão ganhou especial relevância quando o Ministério da Saúde (MS) chamou para si a responsabilidade de orientar a formação dos profissionais da

⁷ saúde para atender às necessidades do SUS.

MACHADO, L. G. F. **Preceptoria: Formação e Competência**. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde). Fortaleza: Universidade Estadual do Ceará, 2017, com adaptações.

Assinale a alternativa que indica a palavra pertencente à classe dos advérbios.

- (A) “Atualmente” (linha 4)
- (B) “final” (linha 2)
- (C) “década” (linha 2)
- (D) “desde” (linha 2)
- (E) “si” (linha 5)

Área livre

QUESTÃO 6

¹ A concepção de formação apontada na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde explicita claramente, em seus documentos normativos, a

⁴ intencionalidade de uma educação coerente com a Educação Problematizadora defendida por Paulo Freire – embora essas relações não estejam devidamente referenciadas.

⁷ Percebem-se diretamente as ideias do pedagogo na afirmação de que o ser humano não pode ser compreendido fora de seu contexto: ele é o sujeito da própria formação e se

¹⁰ desenvolve por meio da reflexão a respeito de seu lugar no

¹¹ mundo, sua realidade e suas vivências.

Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/icse/a/4b6HRp4F5sMsSGqc3wSdZhz/>>. Acesso em: 13 nov. 2023, com adaptações.

Com base no texto, é correto afirmar que a concepção de formação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde tem em Paulo Freire uma

- (A) normatização de conceitos.
- (B) pressuposição teórica.
- (C) perspectiva de metodologias.
- (D) referência bibliográfica.
- (E) inspiração de ideias.

QUESTÃO 7

¹ Apesar dos entraves, principalmente nos momentos iniciais da pandemia, a Atenção Básica permaneceu como a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez

⁴ que se encontra capilarizada pelos territórios e conta com atuação multiprofissional para a assistência, desde a prevenção até o cuidado dos casos suspeitos e confirmados

⁷ de Covid-19. Nesse contexto, os residentes compunham as equipes de saúde, atuando na resolutividade de casos sintomáticos leves e no encaminhamento adequado dos

¹⁰ casos graves para assistência em alta complexidade.

Disponível em: <<https://scielosp.org/article/sdeb/2023.v47n137/42-57/>>. Acesso em: 11 nov. 2023, com adaptações.

No texto, a locução “uma vez que” (linhas 3 e 4) estabelece uma relação de

- (A) comparação.
- (B) causalidade.
- (C) condição.
- (D) finalidade.
- (E) concessão.

Área livre

QUESTÃO 8

Por que o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina?

¹ “Do ponto de vista biológico, os menores níveis de testosterona acabam deixando a mulher mais exposta à doença. Por outro lado, na questão social e psicológica, a
⁴ mulher corriqueiramente está em uma posição de maior vulnerabilidade que o homem e acaba ficando com muitas obrigações, o que aumenta as chances de ela ter mais
⁷ diagnósticos do que ele.” — Volnei Costa, médico psiquiatra e presidente do conselho científico da Abrata.
[...]

¹⁰ Dartiu Xavier da Silveira, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que estuda depressão há anos, também ressalta que historicamente
¹³ idosos e adultos jovens (18 a 29 anos de idade) apresentam mais chances de terem o diagnóstico da doença do que
¹⁵ outras faixas etárias.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/11/06/por-que-o-brasil-tem-a-populacao-mais-depressiva-da-america-latina.ghtml>>. Acesso em: 12 nov. 2023, com adaptações.

A respeito da pontuação do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A vírgula empregada após a palavra “biológico” (linha 1) marca o deslocamento de uma oração de natureza adverbial.
- (B) O travessão empregado antes de “Volnei Costa” (linha 7) tem a função de explicar o termo já enunciado.
- (C) As aspas empregadas antes de “Do ponto de vista (linha 1) e depois de “ele” (linha 7) têm a função de marcar uma citação indireta.
- (D) O trecho “pesquisador da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)” (linhas 10 e 11) tem valor restritivo.
- (E) O trecho “médico psiquiatra e presidente do conselho científico da Abrata” (linhas 7 e 8) tem função explicativa.

QUESTÃO 9

O Pulso Titãs

¹ Peste bubônica, câncer, pneumonia
Raiva, rubéola, tuberculose e anemia
Rancor, cisticercose, caxumba, difteria
⁴ Encefalite, faringite, gripe e leucemia
[...]
Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia
⁷ Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia
Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria
Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania
¹⁰ [...]
Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia
Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia
¹³ Brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia
¹⁴ Catapora, culpa, cárie, cáibra, lepra, afasia

Disponível em: <<https://www.lettras.mus.br/titas/48989/>>. Acesso em: 10 nov. 2023, com adaptações.

Considerando os aspectos linguísticos e as ideias do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 1, o adjetivo “bubônica” confere à palavra “peste” um sentido figurado.
- (B) A palavra “tétano” (linha 12) está empregada em sentido figurado.
- (C) A ênfase retórica do texto recai sobre as doenças físicas.
- (D) Todas as palavras da segunda estrofe (linhas de 6 a 9) são substantivos.
- (E) A palavra “afasia” (linha 14) tem sentido de “apatia” no texto.

QUESTÃO 10

A radical influência da tecnologia no sono das pessoas

¹ Dos monitores de sono até os medicamentos para ficar acordado, o século 21 vem trazendo um conjunto de novas tecnologias capaz de alterar radicalmente a forma
⁴ como dormimos.

Muitas dessas novas tecnologias pretendem otimizar o sono. Elas prometem ajudar a adaptar o cronograma do
⁷ sono à nossa vida social, ajudar-nos a dormir por mais tempo ou até pular uma noite de sono por completo.

Analizamos aqui como a tecnologia vem permeando o
¹⁰ nosso sono e o que nos reserva o futuro.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/06/13/a-radical-influencia-da-tecnologia-no-sono-das-pessoas.ghtml>>. Acesso em: 10 nov. 2023, com adaptações.

Em relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 10, a forma verbal “reserva” concorda com o sujeito “o futuro”.
- (B) A palavra “capaz” (linha 3) estabelece concordância nominal com “século 21” (linha 2).
- (C) Na linha 5, a palavra “otimizar” tem sentido figurado no texto.
- (D) A forma verbal “prometem” (linha 6) concorda com o sujeito “Muitas dessas novas tecnologias” (linha 5).
- (E) Na linha 1, a palavra “até” estabelece sentido de limitação.

Área livre

QUESTÃO 11

A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) possui o objetivo de promover a saúde das populações do campo e da floresta por meio de ações e iniciativas que reconheçam as especificidades de gênero, geração, raça/cor, etnia e orientação sexual, visando ao acesso aos serviços de saúde, à redução de riscos e agravos à saúde decorrentes dos processos de trabalho e das tecnologias agrícolas e à melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade de vida. Na elaboração de planos, programas, projetos e ações de saúde, alguns princípios e diretrizes são observados.

Assinale a alternativa que apresenta um princípio e (ou) diretriz referente à PNSIPCF.

- (A) Promover a inclusão, no Plano Nacional de Saúde, das metas e prioridades para a organização das ações de saúde para as populações do campo e da floresta.
- (B) Promover a inclusão da PNSIPCF no Plano Municipal de Saúde.
- (C) Produzir dados estratificados a respeito das populações do campo e da floresta e manter atualizados os sistemas nacionais de informação em saúde.
- (D) Valorizar práticas e conhecimentos tradicionais, com a promoção do reconhecimento da dimensão subjetiva, coletiva e social dessas práticas e a produção e reprodução de saberes das populações tradicionais.
- (E) Garantir o acesso aos serviços de saúde com resolutividade, qualidade e humanização, incluindo as ações de atenção, as especializadas de média e alta complexidade e as de urgência e de emergência, de acordo com as necessidades e demandas apontadas pelo perfil epidemiológico da população atendida.

QUESTÃO 12

No Sistema Único de Saúde, há um princípio o qual afirma que deve ser garantido ao usuário, o acesso a todos os níveis de atenção, tendo prioridade as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

O princípio que retrata essa informação é o da

- (A) equidade.
- (B) regionalização.
- (C) universalidade.
- (D) hierarquização.
- (E) integralidade.

Área livre**QUESTÃO 13**

Segundo a Lei nº 8.080/1990, título III-A, art. 26-A, a telessaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal, e deve obedecer a determinados princípios, entre os quais é correto citar

- (A) regionalização.
- (B) dignidade e valorização do profissional de saúde.
- (C) promoção da equidade de acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde.
- (D) igualdade de assistência à saúde.
- (E) organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 14

O atual modelo de prestação de serviços de saúde do Brasil – o Sistema Único de Saúde (SUS) – é resultado de um processo histórico conhecido com o movimento sanitário brasileiro, intensificado a partir das décadas de 1970 e de 1980.

A respeito desse processo histórico, assinale a alternativa correta.

- (A) A criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, configurou uma medida de racionalização administrativa sem alterar a tendência do período anterior de expansão dos serviços, em particular da assistência médica e da cobertura previdenciária.
- (B) O Movimento Sanitário Brasileiro teve como ponto alto de sua articulação a VI Conferência Nacional de Saúde em 1984.
- (C) As pressões populares e do movimento sanitário não conseguiram avanço no campo da extensão de cobertura em função do modelo político vigente.
- (D) O SUS foi proposto com uma nova fase da política brasileira, estabelecida com a revolução de 1988.
- (E) Os indicadores de saúde da época do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) melhoraram.

Área livre

QUESTÃO 15

As atividades da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) têm como referência o conceito de saúde, tal como o concebe a Organização Mundial de Saúde (OMS) – “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade” – e o preceito constitucional de reconhecer a saúde como um “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da Constituição Federal de 1988).

Assinale a alternativa que apresenta um objetivo da CNDSS.

- (A) Manter o portal referente aos Determinantes Sociais de Saúde (DSS), o qual, além de informações acerca das atividades da CNDSS, inclui dados, informações e conhecimentos a respeito dos DSS existentes nos sistemas de informação e na literatura mundial e nacional.
- (B) Apresentar recomendações concretas de políticas, programas e intervenções para o combate às iniquidades de saúde geradas pelos DSS.
- (C) Apoiar o desenvolvimento de políticas e programas para a promoção da equidade em saúde.
- (D) Atuar nas condições materiais e psicossociais nas quais as pessoas vivem e trabalham, buscando assegurar melhor acesso a água limpa, tratamento de esgoto, habitação adequada, alimentos saudáveis, serviços de saúde e educação de qualidade.
- (E) Expressar, com maior ou menor nível de detalhe, o conceito, atualmente bastante generalizado, de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com a respectiva situação de saúde.

QUESTÃO 16

A epidemiologia busca respostas para questões relacionadas com os diversos agravos à saúde. Essa atividade deve ser norteadada por uma série de etapas que permitirão, a quem estiver desenvolvendo a pesquisa, obter informações que o auxiliem na tomada de decisões. Assim, as decisões clínicas, sociais, ou mesmo políticas relacionadas com a saúde das populações devem ser fundamentadas em uma investigação científica rigorosa, de modo a maximizar os benefícios e minimizar custos/agravos.

Com base nos delineamentos de estudo dentro da epidemiologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Avaliar tendências temporais na mortalidade decorrente de afogamento nas cinco regiões do Brasil, de 2010 a 2020, é um estudo do tipo transversal.
- (B) Estudos observacionais são aqueles que têm por base a observação da magnitude da ocorrência de determinados eventos com interferência direta sobre o objeto de estudo.
- (C) Estudos observacionais podem ser categorizados como descritivos e analíticos. Os analíticos também se subdividem em estudos ecológicos e experimentais.
- (D) Os estudos epidemiológicos são, geralmente, classificados como estudos observacionais.
- (E) Os estudos de coorte normalmente apresentam curta duração e baixo custo.

QUESTÃO 17

Educação na saúde consiste na produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e ao desenvolvimento para a atuação em saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes didáticas e orientação curricular. A educação no século 20 tornou-se permanente e social, e as ideias universalmente difundidas entre elas é a de que não há idade para se educar, de que a educação se estende pela vida e ela não é neutra, mas engajada. Para tanto, há duas modalidades de educação no trabalho em saúde: educação continuada e educação permanente.

Com relação a essas duas modalidades de educação no trabalho em saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A educação permanente envolve as atividades de ensino após a graduação, possui duração definida e utiliza metodologia tradicional, tais como as pós-graduações.
- (B) O desafio da educação permanente é estimular o desenvolvimento da consciência nos profissionais, relacionada ao respectivo contexto, pela própria responsabilidade em seu processo de capacitação. Tem como cenário o próprio espaço de trabalho, no qual o pensar e o fazer são insumos fundamentais do aprender e do trabalhar.
- (C) A educação permanente caracteriza-se por alternativas educacionais mais centradas no desenvolvimento de grupos profissionais, seja por meio de cursos de caráter seriado, seja por meio de publicações específicas em determinado campo.
- (D) A educação continuada consiste em ações educativas embasadas na problematização do processo de trabalho em saúde e que tenham como objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, tomando como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, a reorganização da gestão setorial e a ampliação dos laços da formação com o exercício do controle social em saúde.
- (E) A educação continuada estrutura-se a partir de dois elementos: as necessidades do processo de trabalho e o processo crítico como inclusivo ao trabalho.

Área livre

QUESTÃO 18

Consideramos que no mundo existam diversos modelos assistenciais calcados na compreensão da saúde e da doença, nas tecnologias disponíveis em determinada época para intervir na saúde e na doença e nas escolhas políticas e éticas que priorizam os problemas a serem enfrentados pela política de saúde. Por esse motivo, ressaltamos que não há modelos certos ou errados, ou receitas que, quando seguidas, darão certo. Observem o que nos diz Merhy sobre o assunto:

O tema de qualquer modelo de atenção à saúde faz referência não a programas, mas ao modo de se construir a gestão de processos políticos, organizacionais e de trabalho que estejam comprometidos com a produção dos atos de cuidar do indivíduo, do coletivo, do social, dos meios, das coisas e dos lugares. E isto sempre será uma tarefa tecnológica, comprometida com necessidades enquanto valores de uso, enquanto utilidades para indivíduos e grupos (MERHY, 2000:2).

SILVA JÚNIOR, A. G. da; ALVES, C. A. Modelos assistenciais em saúde: desafios e perspectivas. In: MOROSINI, M. V. G. C.; CORBO, A. D. A. *Modelos de atenção e a saúde da família*. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007, p. 27-41.

Com base nos modelos de atenção à saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A partir da década de 1930, a política de saúde pública ainda não havia estabelecido formas mais permanentes de atuação, mesmo com a instalação de centros e postos de saúde para atender, de modo rotineiro, a determinados problemas. Por causa disso, demorou oito anos para se começar a pensar na criação de alguns programas, como pré-natal, vacinação, puericultura, tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e outros.
- (B) No modelo instituído a partir da década de 1930, em que se estruturaram as redes estaduais de saúde, a assistência era voltada para os segmentos mais favorecidos, ou seja, com mais demanda financeira da população.
- (C) A instauração do governo militar, no ano de 1964, determinou novas mudanças. Desunificou os Iaps no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e retirou o foco na assistência à saúde individual, pois as ações de saúde pública eram de responsabilidade dos governos estaduais e do município.
- (D) Em 1975, definiu-se um Sistema Nacional de Saúde em que as atividades de saúde pública deixaram de ser desarticuladas da assistência médica individual e passaram a ser prioritariamente desarticuladas pelo limite da biomédica.
- (E) A maior parte das propostas tecnoassistenciais desenvolvidas para o Sistema Único de Saúde (SUS) centram-se na reorganização da atenção básica. Mas é fundamental que haja transformações no âmbito hospitalar e em outras partes do sistema de saúde. Uma mudança importante é desenvolver práticas humanizadas de acolhimento de pessoas na atenção hospitalar, tais como a incorporação da presença de acompanhantes e familiares na internação.

Área livre

QUESTÃO 19

Para cada grupo de doenças ou de eventos de interesse em saúde pública, existem sistemas que coletam dados e disponibilizam informações com o intuito de contribuir para a definição de prioridades nos diferentes níveis de atenção. Em razão da relevância para a Vigilância Epidemiológica, alguns sistemas de informação em saúde se destacam.

A esse respeito, assinale a alternativa que corresponde ao objetivo do sistema de informação em saúde indicado.

- (A) Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) – coleta dados da declaração de nascido vivo sobre a gestação, o feto, o parto, a criança nascida e a atenção pré-natal.
- (B) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) – contempla o registro das informações produzidas por todas as equipes de atenção básica. É composto por dois sistemas de captação de dados: Coleta de Dado Simplificado (CDS) e Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).
- (C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) – coleta dados sobre doenças de notificação compulsória. Perpassa todas as esferas de governo, alimentando bancos de dados municipal, estadual e nacional.
- (D) Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SUS) (SIA/SUS) – coleta dados cuja fonte é a declaração de óbito.
- (E) Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (Sisab) – contempla atendimentos e procedimentos ambulatoriais.

QUESTÃO 20

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas visa a garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e a transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura.

Assinale a alternativa que contempla uma diretriz da Política Nacional de Atenção à saúde dos povos indígenas.

- (A) Controle social.
- (B) Disponibilidade de serviços, recursos humanos e infraestrutura.
- (C) Relações sociais entre os diferentes povos indígenas do território e a sociedade regional.
- (D) Atenção básica realizada por intermédio dos agentes indígenas de saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes multidisciplinares periodicamente, conforme planejamento das suas ações.
- (E) Os serviços de saúde e as comunidades terão outra instância de atendimento, que serão denominados Pólos-Base.

QUESTÃO 21

Em relação à radioproteção, assinale a alternativa correta.

- (A) O bom senso dos profissionais é suficiente para regulamentar o uso da radiação X.
- (B) Filmes dosimétricos devem ser usados para todos os pacientes.
- (C) O treinamento da equipe não é uma forma de radioproteção.
- (D) A voltagem do tubo de raios X deve ser menor que 50 kV.
- (E) A dose de radiação para os dentistas e suas equipes pode ser proveniente de feixe primário, radiação espalhada e radiação de fuga do cabeçote.

QUESTÃO 22

Acerca das técnicas radiográficas extraorais em odontologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A radiografia lateral oblíqua não deve ser utilizada em pacientes com fraturas de mandíbula.
- (B) A radiografia panorâmica é a segunda técnica extraoral mais utilizada na odontologia.
- (C) A projeção submentovértice é bastante indicada na odontologia.
- (D) A radiografia denominada Towne reversa nada mais é que uma radiografia posteroanterior de mandíbula.
- (E) A maior indicação da radiografia cefalométrica se dá em razão do planejamento cirúrgico.

QUESTÃO 23

No tumor odontogênico adenomatoide, considera(m)-se o mais marcante(s)

- (A) a lesão radiolúcida.
- (B) as múltiplas calcificações no interior da lesão.
- (C) o tamanho menor que 3 cm.
- (D) o fato de estar associado a dente retido.
- (E) o fato de ser benigno.

QUESTÃO 24

No que se refere à candidose, assinale a alternativa correta.

- (A) Acontece mais em crianças.
- (B) *Candida albicans* não se relaciona à doença.
- (C) A boca é pouco acometida.
- (D) É assintomática.
- (E) O tratamento é com antifúngico.

Área livre

QUESTÃO 25

Em relação às características histopatológicas dos queratocistos odontogênicos, assinale a alternativa correta.

- (A) O queratocisto odontogênico exibe uma cápsula espessa e resistente.
- (B) A camada basal epitelial é composta por células em paliçada, coloidais ou colunares.
- (C) As células epiteliais são hipocromáticas na maioria dos casos.
- (D) Pequenos cistos ou ilhas satélites são observados no lúmen cístico.
- (E) O revestimento epitelial é composto por 20 a 25 células de espessura.

QUESTÃO 26

Quais são os padrões histopatológicos mais comuns dos ameloblastomas intraósseos sólidos convencionais?

- (A) Folicular e plexiforme
- (B) Acantomatoso e de células granulares
- (C) Desmoplásico e de células basais
- (D) Acantomatoso e de células basais
- (E) Desmoplásico e de células granulares

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa correspondente ao aspecto microscópico que pode ser observado em células epiteliais de uma lesão de leucoplasia bucal sem displasia.

- (A) Células e núcleos aumentados
- (B) Relação núcleo-citoplasma aumentada
- (C) Figuras de mitose anormais
- (D) Hiperceratose
- (E) Nucléolos grandes e proeminentes

QUESTÃO 28

Um paciente de 6 anos de idade foi levado à clínica odontológica com queixa de hematoma na bochecha. Na anamnese, a mãe relatou que a lesão foi observada desde o nascimento, porém se encontra com crescimento lento até o momento. Após o exame físico, constatou-se uma mancha avermelhada na mucosa jugal do lado direito. Com base nesse relato clínico, assinale a alternativa que indica a manobra semiotécnica a ser realizada especificamente para avaliação de lesão vascularizada.

- (A) Auscultação
- (B) Ordenha
- (C) Diascopia
- (D) Percussão
- (E) Raspagem

Área livre

QUESTÃO 29

Uma paciente de 25 anos de idade foi encaminhada à clínica para avaliação de múltiplas lesões na mucosa bucal. Na história médica, relatou não ser fumante e que as lesões eram recidivantes. Ao exame físico intrabucal, foram observadas úlceras de 3 mm a 5 mm de diâmetro, localizadas na mucosa jugal, labial e lateral da língua, com sintomatologia dolorosa. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é

- (A) candidose pseudomembranosa.
- (B) língua geográfica.
- (C) líquen plano erosivo.
- (D) carcinoma de células escamosas.
- (E) ulceração aftosa recorrente.

QUESTÃO 30

Uma das infecções sexualmente transmissíveis que causa lesões bucais é a sífilis. Por esse motivo, é importante para o cirurgião-dentista saber reconhecer e conduzir casos suspeitos. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente após um ano de infecção, a sífilis pode ser considerada secundária.
- (B) Na fase secundária, são comuns as placas em mucosas, assim como lesões acinzentadas e pouco visíveis nas mucosas.
- (C) O agente etiológico da sífilis é o bacilo de Koch.
- (D) O exame VDRL (do inglês *Venereal Disease Research Laboratory*) é importante para o monitoramento da resposta ao tratamento, mas não para o diagnóstico.
- (E) O tratamento de sífilis deve ser feito por um antibiótico de amplo espectro, como a ampicilina, tendo em vista fartos registros de resistência bacteriana a benzilpenicilina.

QUESTÃO 31

Os profissionais da área da saúde, notadamente os cirurgiões-dentistas, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de aquisição de doenças infecciosas e, por isso, precisam estar devidamente imunizados. As vacinas mais importantes para os profissionais da odontologia são

- (A) hepatite B, influenza, tríplice viral e dupla tipo adulto.
- (B) hepatite B, influenza, tríplice viral e febre amarela.
- (C) hepatite C, influenza, febre amarela e dupla tipo adulto.
- (D) hepatite B, influenza, dupla tipo adulto e tetravalente viral celular.
- (E) hepatite C, influenza, tetravalente bacteriana celular e poliomielite.

QUESTÃO 32

No que tange à histologia dos tecidos bucais, assinale a alternativa correta.

- (A) A dentina constitui a maior parte do dente; ela é constituída por hidroxiapatita 70%, e é a terceira substância mais dura do corpo.

- (B) O ligamento periodontal é um tecido conjuntivo frouxo e bem modelado, cujos principais grupos de fibras, compostos por colágeno tipo VI, mantêm o dente suspenso em seu alvéolo.
- (C) O lábio apresenta quatro regiões: a pele, a zona vermelha, a mucosa externa e a mucosa interna.
- (D) A odontogênese começa com o aparecimento da bainha de Hertwig.
- (E) O cemento recobre a dentina da raiz; ele é constituído em 50% por hidroxiapatita e tem aproximadamente a mesma dureza do osso.

QUESTÃO 33

Existem diversas anomalias causadas por defeitos embriológicos, que culminam em alterações congênitas. Entre as mais comuns, relacionadas ao desenvolvimento facial, estão a fenda palatina e (ou) labial. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O período crítico da palatogênese é a partir do final da décima quinta semana até o início da vigésima semana de gestação.
- (B) O palato secundário forma a face anterior e a linha média da maxila. Ele representa apenas uma pequena parte do palato duro no adulto (anterior à fossa incisiva).
- (C) A fenda do lábio superior resulta da falha de massas mesenquimais de se fundirem nas proeminências nasais mediais e maxilares.
- (D) A fenda palatina resulta da falha de massas mesenquimais nos processos palatinos laterais de se fundirem posteriormente às proeminências maxilares, região também conhecida como pré-maxila.
- (E) Ainda que nenhum dos pais apresente o defeito embriológico, é provável que a causa dele na criança seja genética, pois essa alteração tem cunho exclusivamente genético.

QUESTÃO 34

De acordo com o *Guia de orientações para a prática odontológica no contexto da Covid-19*, publicado pelo Ministério da Saúde em 2022, em sua segunda edição, no que se refere à limpeza e desinfecção de superfícies, assinale a alternativa correta.

- (A) O álcool a 70% tem ótima ação germicida, age por oxidação e apresenta nível médio de ação.
- (B) O álcool a 70% tem espectro tuberculicida, bactericida, fungicida, virucida, não esporicida, sendo de fácil aplicação, porém é volátil.
- (C) O hipoclorito de sódio (1%) age por fricção, nível médio, bactericida, fungicida, virucida e não esporicida.
- (D) O hipoclorito de sódio (1%) tem ação rápida e é indicado para superfícies e artigos metálicos.
- (E) O hipoclorito de sódio (1%) apresenta como desvantagem o fato de ser instável, não corrosivo, inativado na presença de matéria orgânica.

Área livre

QUESTÃO 35

Na que concerne à higienização das mãos na prática odontológica, assinale a alternativa correta.

- (A) Ao se optar pela utilização de produtos à base de álcool, a concentração do princípio ativo deve estar entre 40% e 90% p/p, de etanol ou isopropanol (solução alcalina).
- (B) A pele deve ser friccionada até que a solução alcoólica evapore quase totalmente e as mãos fiquem semiúmidas.
- (C) Os locais mais frequentemente esquecidos durante a higienização das mãos são as pontas dos dedos, os espaços interdigitais e a palma.
- (D) Após retirar as luvas, é necessário lavar as mãos por causa de resíduos deixados pela cobertura interna desse EPI e pela possibilidade de contaminação da pele.
- (E) Mesmo com as mãos secas e limpas, não basta somente aplicar soluções que dispensam enxágue, mas é necessário lavá-las com água e sabão.

QUESTÃO 36

Em relação ao processo de desinfecção e esterilização de instrumental odontológico, assinale a alternativa correta.

- (A) A corrosão no instrumental poderá ser removida, desde que não comprometa a utilização do artigo pelo uso de soluções ácidas preaquecidas.
- (B) O uso de estufas está proibido em odontologia, não sendo permitido nem mesmo para secagem de materiais.
- (C) A corrosão no instrumental poderá ser removida com a utilização de produtos e objetos abrasivos.
- (D) A desinfecção é definida como um processo físico ou químico que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, incluindo esporos bacterianos.
- (E) Embalagens compostas de filme plástico polipropileno devem ter o ar totalmente removido antes da selagem, gerando um vácuo, pois o ar atua como um obstáculo na transmissão de calor e de umidade.

Área livre

QUESTÃO 37

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), à medida em que são introduzidos novos tipos de resíduos nas unidades de saúde e como resultado do conhecimento do comportamento destes perante o meio ambiente e a saúde, a classificação desses resíduos vem sofrendo um processo de evolução contínuo, com base nos princípios da avaliação e no gerenciamento dos riscos envolvidos na sua manipulação, como forma de estabelecer uma gestão segura. Quanto à classificação de resíduos de serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Grupo C2 – resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes
- (B) Grupo A5 – kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados
- (C) Grupo F – perfurocortantes
- (D) Grupo A4 – órgãos, tecidos, fluidos orgânicos
- (E) Grupo D – resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde

QUESTÃO 38

Considerando a segurança do paciente, mais especificamente a realização de cirurgias seguras, assinale a alternativa correta.

- (A) O evento adverso é sinônimo de erro.
- (B) O evento adverso é uma complicação esperada.
- (C) O uso inadequado de antibióticos pode levar a um evento adverso, mas pode ter ocorrido por um erro na prescrição inicial.
- (D) Qualquer procedimento cirúrgico pode ser seguido de um evento adverso, mas, para isso, é necessário que tenha ocorrido erro de técnica ou conduta.
- (E) O erro é um desvio de um procedimento que deveria ter levado apenas a um evento adverso.

QUESTÃO 39

Acerca de infecção cruzada em consultório odontológico, assinale a alternativa correta.

- (A) Não se recomenda o uso de adornos como brincos, tanto pelo paciente quanto pelos profissionais, principalmente durante a realização de procedimentos geradores de aerossóis.
- (B) Algodão, gaze e demais materiais de uso único não devem ser previamente separados antes do procedimento, e sim colocados em dispensador único, o qual pode ser utilizado para todos os pacientes, visando à ergonomia.
- (C) Limpeza concorrente e terminal do consultório deve ser realizada após o atendimento de cada paciente.
- (D) Estando corretamente paramentado após risco de exposição a fluidos corporais, não há necessidade de lavar as mãos.
- (E) Durante a execução dos procedimentos, especialmente aqueles que envolvem a produção de aerossóis, muitas superfícies dos serviços odontológicos são contaminadas com saliva e demais materiais orgânicos, mas não com sangue, em virtude de sua alta densidade.

QUESTÃO 40

Para realizar a hemostasia das feridas cirúrgicas, incluindo alvéolos dentários, diferentes instrumentos, produtos e técnicas podem ser usados. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A pinçagem é realizada utilizando-se pinças hemostáticas, aprisionando as extremidades dos vasos sanguíneos seccionados e deve ser sempre acompanhada de ligadura da extremidade do vaso com fios de sutura.
- (B) A termocoagulação é realizada aplicando-se uma corrente elétrica sobre o vaso sangrante. Por usar corrente elétrica, a remoção de metais presentes no corpo do paciente, como anéis, brincos, entre outros, é recomendada, mas não obrigatória.
- (C) Os hemostáticos de colágeno, geralmente bovino, são derivados de tecidos orgânicos e têm considerável força de tensão, alta afinidade pela água, baixa antigenicidade; são absorvidos pelo corpo e promovem a ativação plaquetária. Devem ser utilizados com cuidado, em razão de a incidência de reações alérgicas ou reações imunes ser alta.
- (D) O primeiro e o mais pronto agente hemostático é a compressão do foco hemorrágico; portanto, a compressão com gaze poderá ser realizada manualmente ou com uso de instrumentos cirúrgicos, por, no mínimo, de 3 minutos.
- (E) A celulose oxidada umedecida com sangue torna-se levemente pegajosa, adere às cavidades a preencher, expande-se e forma massa gelatinosa; quando implantada nos tecidos ou em contato com os tecidos fluidos, ela forma um coágulo artificial, produzindo, assim, hemostasia local.

QUESTÃO 41

Uma paciente de 35 anos de idade necessita remover o dente 26. Durante a anamnese, ela relatou crises frequentes de sinusite maxilar nos últimos 12 meses e uso regular de losartana potássica 25 mg/dia para hipertensão arterial. Sua última consulta com o cardiologista foi há quatro semanas. Ela negou outras comorbidades. No momento do exame, apresentava FC = 89 bpm, FR = 16 rpm, PA = 122 mmHg x 83 mmHg e SatO₂ = 95%. Com base nesse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) De maneira geral, para extração do dente 26, o plano oclusal deve estar em 60 graus com o solo, e o fórceps indicado é o 18R.
- (B) Caso a paciente apresente sinusite aguda, a exodontia não deve ser adiada, pelo risco de agravamento da sinusite, evoluindo para complicações infecciosas como a trombose do seio cavernoso.
- (C) Considerando que a radiografia periapical desse caso revelou que as raízes do dente 26 estão intimamente relacionadas ao seio maxilar, deve-se optar pela técnica cirúrgica aberta, com divisão das raízes e extração individualizada de cada uma delas.
- (D) Tendo em vista o quadro sistêmico da paciente (ASAIII), a cirurgia deve ser realizada somente após avaliação cardiológica, mesmo se a paciente estivesse com dor no dente 26.

- (E) Durante a exodontia, caso a raiz distovestibular seja acidentalmente impulsionada para o seio maxilar, ela poderá ser removida por meio de uma incisão em fundo de vestibulo na região de molares, seguida do descolamento mucoperiosteal na crista maxilar e osteotomia acima dos ápices dentais dos molares, obtendo-se assim acesso direto ao seio maxilar.

QUESTÃO 42

Um paciente de 13 anos de idade apresenta o dente 63 no arco, sem diastemas. A radiografia panorâmica revela o dente 23 retido com 2/3 da sua raiz formada e a coroa superposta à raiz do 22. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) Depois dos terceiros molares, os caninos são os dentes inclusos de maior frequência, que aparecem nos maxilares; a exodontia, nesse caso, está indicada em razão da proximidade com a raiz do 22.
- (B) A radiografia panorâmica é suficiente para o planejamento cirúrgico nesse caso, independentemente da técnica escolhida.
- (C) Tendo em vista que o dente em tela está localizado por vestibular em relação aos dentes adjacentes, sua remoção teria maior grau de dificuldade, necessitando de mais odontosseções para a remoção completa do dente, sem danos às estruturas anatômicas.
- (D) Considerando especialmente a idade e o estágio de formação radicular descritos, a cirurgia para aproveitamento do 23 deve ser realizada imediatamente, e a necessidade de obter espaço no arco poderá ser verificada por um ortodontista após a cirurgia.
- (E) Se o folículo pericoronário do dente 23 apresentar espessura de 5 mm, deve-se suspeitar de condições patológicas, como cistos de desenvolvimento, sendo necessária a completa remoção do capuz e recomendável a sua análise histopatológica.

Área livre

QUESTÃO 43

Um homem saudável de 27 anos de idade foi encontrado inconsciente após queda de bicicleta em via pública. As lesões mais evidentes, no primeiro momento, foram laceração no mento, escoriação em lábio inferior e blefarohematoma localizados no lado direito da face. Quanto a esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Após o acidente, estando a cena segura, inicia-se a avaliação primária da vítima (ABCDE), começando pelo tratamento da via respiratória e avaliação da respiração (A).
- (B) Considerando que o paciente, ao ser contactado verbalmente, abriu os olhos, foi capaz de responder aos questionamentos do socorrista, embora de forma confusa e, além disso, foi capaz de executar movimentos obedecendo aos comandos do socorrista, seu escore na escala de coma de Glasgow corresponde a 5.
- (C) A ferida deve ser irrigada exaustivamente com uma solução salina; em seguida, deve-se usar uma solução degermante à base de clorexidina ou iodo na pele ao redor para, então, fazer a anestesia local.
- (D) Nesse caso, é possível ocorrer uma fratura por contragolpe no côndilo esquerdo, especialmente se, durante o exame físico, forem observados alteração da oclusão dentária e desvio da mandíbula para a esquerda.
- (E) Caso seja constatada uma fratura mandibular, deve-se proceder a odontossíntese, barras pré-fabricadas feitas de metal maleável (barras de Erich), um método de odontossíntese eficaz, barato, de fácil instalação e remoção.

QUESTÃO 44

Os tecidos moles faciais comumente estão envolvidos em queimaduras que podem ser causadas pelo contato com chamas, líquidos quentes, metais aquecidos e gases irritantes, entre outros. As queimaduras talvez sejam os traumas mais graves aos quais o homem está sujeito, podendo apresentar gravidade e extensão diversas. Com relação à queimadura térmica em face, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma queimadura envolvendo toda a face corresponde de 10% a 20% da superfície corpórea, na dependência de o paciente ser um adulto, uma criança ou um bebê.
- (B) Quando a queimadura facial está associada a queimaduras em outras partes do corpo, pode ocorrer o choque hipovolêmico em virtude da diminuição do volume sanguíneo.
- (C) A aplicação de gelo na pele queimada promove um pouco de analgesia, causa vasoconstrição e reduz a destruição tecidual.
- (D) Uma queimadura de espessura total apresenta três zonas de lesão: a zona de coagulação, em que há pequena destruição tecidual; a zona de estase, onde o dano celular é irreversível; e a zona de hiperemia, mais afastada, caracterizada por lesões celulares mínimas e aumento do fluxo sanguíneo.
- (E) Os cuidados locais com as queimaduras superficiais e de espessura parcial consistem em realizar um curativo com gaze após a limpeza suave com solução degermante, remoção das vesículas e do epitélio desvitalizado; caso a ferida fique aberta, a epiteliação não ocorrerá.

QUESTÃO 45

Uma paciente de 45 anos de idade, saudável, vítima de acidente automobilístico, foi atendida pela equipe médica e encaminhada para avaliação bucomaxilofacial, já tendo sido descartados TCE e outros traumas. Apresentou queixas como desconforto ao falar e abrir a boca, além de parestesia do lábio superior e dos dentes superiores anteriores. Ao exame físico, observam-se retrusão do terço médio com achatamento da face, má oclusão, mordida aberta com contato prematuro dos dentes posteriores, pequena laceração dos tecidos moles do vestíbulo oral e mobilidade maxilar à palpação. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) O deslocamento da maxila em direção inferior e posterior pode ocorrer em virtude da ação dos músculos pterigoideos, caso a fratura estenda-se até a região das lâminas pterigoideas do osso esfenóide.
- (B) Nesse caso, a suspeita de uma fratura de maxila pode ser confirmada por uma única radiografia panorâmica.
- (C) Após o exame de imagens, ao confirmar uma fratura Le Fort III, o tratamento consistirá em bloqueio intermaxilar transoperatório apenas para restabelecimento da oclusão, enquanto as fraturas são reduzidas e estabilizadas com miniplacas de titânio e parafusos por meio do acesso intraoral circunvestibular superior.
- (D) O processo de cicatrização de um osso fraturado se dá em três estágios: inflamatório, reparador e de remodelamento. Na fase inflamatória, os osteoclastos vão reabsorvendo o osso medular e os osteoblastos vão depositando osso compacto.
- (E) Para fixação de fraturas de maxila, utiliza-se frequentemente um sistema de placas e parafusos de titânio de 2.7 mm, que requerem remoção em um segundo tempo cirúrgico.

Área livre

QUESTÃO 46

Um jovem saudável de 17 anos de idade chegou ao consultório para remover o dente 38 retido. Ele estava sentindo leve prurido no tórax e nos membros superiores. O rapaz havia se alimentado habitualmente e tomado 1 g de amoxicilina como profilaxia antibiótica 20 minutos antes. Sentou-se na recepção para aguardar a cirurgia. Nesse ínterim, o prurido acentuou-se, surgiram pápulas eritematosas no pescoço e edema perioral. A monitoração revelou PA = 121 mmHg x 82 mmHg, FC = 115 bpm, FR = 20 irpm e SpO₂ = 94%. Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Tendo em vista que o paciente pesa 60 kg, as manifestações descritas correspondem à superdosagem por penicilina.
- (B) Os sintomas indicam reações alérgicas tipo III, (complexo imune) restritas à pele, de início tardio, portanto, com baixo risco de morte.
- (C) A julgar pelos sinais e sintomas descritos no enunciado, os quais correspondem a uma reação alérgica cutânea leve e tardia, o tratamento adequado é a prescrição de corticoides, como a dexametasona, por via oral durante três a quatro dias.
- (D) Considerando que, no minuto seguinte, o paciente apresenta dificuldade respiratória, aumento na transpiração, sibilos, taquicardia e ansiedade, além de rouquidão, configura-se um quadro de anafilaxia com broncoespasmo.
- (E) A adrenalina é o medicamento mais importante no tratamento inicial de todas as reações alérgicas imediatas envolvendo tanto o sistema respiratório como cardiovascular. Nesses casos, a dose recomendada é 1 mL de adrenalina 1:100.000 unidades via intramuscular.

QUESTÃO 47

Um paciente de 67 anos de idade necessita tratar o canal do dente 13 por causa de lesão periapical crônica. O paciente é portador de doença arterial coronariana, com angina do peito e episódios de duas a três vezes por mês ao esforço físico ou estresse emocional com duração sempre inferior a três minutos. Ele não tem histórico de revascularização (angioplastia), mas segue em acompanhamento com seu cardiologista, fazendo uso de ácido acetilsalicílico 325 mg e atenolol (betabloqueador seletivo) 50 mg diariamente, além de dinitrato de isossorbida 5 mg sublingual durante as crises.

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) Esse paciente é portador de angina instável (ASA 4), pois não foi submetido à revascularização, portanto, procedimentos odontológicos eletivos estão contraindicados.
- (B) Não há limite total de tempo para tratamento desse paciente. O procedimento somente deve ser interrompido caso ocorram sinais ou sintomas de fadiga, aumento da pressão arterial ou da frequência cardíaca por mais de 20 minutos.
- (C) O oxigênio suplementar é uma boa opção para ser utilizada no caso em questão; um fluxo de 3 a 5 L/min via cânula nasal durante o atendimento minimiza o possível desenvolvimento de isquemia miocárdica.

- (D) A administração de vasopressores não é segura e está contraindicada em pacientes com doença arterial coronariana e risco ASA 3, como o paciente desse caso clínico.
- (E) Considerando que o paciente apresenta quadro intenso de dor no peito com irradiação para o membro superior esquerdo durante o procedimento, até seis doses de nitroglicerina sublingual em intervalos de 7 minutos, além de oxigênio suplementar, podem ser fornecidos para tratar a angina.

QUESTÃO 48

A série de ações que aumentam a chance de sobrevivência após a parada cardiorrespiratória (PCR) configura a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), quando a vítima se encontra fora do ambiente hospitalar e são oferecidos cuidados que fazem parte do suporte básico de vida (SBV). De acordo com as diretrizes vigentes para RCP e SBV, assinale a alternativa correta.

- (A) A cadeia da sobrevivência em PCR extra-hospitalar apresenta os seguintes elos: acionamento do serviço médico de emergência, RCP de alta qualidade, desfibrilação, ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR e recuperação.
- (B) No caso de dois socorristas em atendimento a uma PCR em um adulto fora do ambiente hospitalar, a relação compressão-ventilação deverá ser de 15:2.
- (C) Nas compressões torácicas, o tórax deve ser comprimido por 3 cm a 4 cm em uma frequência de 80 a 100 vezes por minuto.
- (D) Considerando que um desfibrilador automático esteja disponível, o choque deverá ser aplicado se houver assistolia.
- (E) Se dois socorristas ou mais estiverem atendendo a uma PCR em um adulto fora do ambiente hospitalar, os responsáveis pelas compressões torácicas devem ser alternados a cada 5 minutos de RCP.

QUESTÃO 49

Os músculos da mastigação são responsáveis pela movimentação da mandíbula durante a ação de mastigar alimentos, trabalhando em conjunto para permitir que o indivíduo quebre e processe o alimento para facilitar sua digestão. Entre os principais músculos da mastigação, os mais superficiais e fáceis de realizar palpação são

- (A) pterigoideo lateral e masseter.
- (B) pterigoideo medial e pterigoideo lateral.
- (C) masseter e temporal.
- (D) masseter e pterigoideo medial.
- (E) temporal e pterigoideo lateral.

Área livre

QUESTÃO 50

O líquido sinovial na articulação temporomandibular (ATM) desempenha um papel crucial na lubrificação e no amortecimento da articulação, reduzindo o atrito entre os ossos da mandíbula e do crânio, garantindo movimentos suaves e confortáveis durante a mastigação e a fala. A principal estrutura revestida internamente pela membrana sinovial que produz o líquido sinovial e preenche as duas cavidades da ATM é a (o)

- (A) disco articular.
- (B) cápsula articular.
- (C) zona retrodiscal.
- (D) cabeça da mandíbula.
- (E) osso temporal.

QUESTÃO 51

A artrite da articulação temporomandibular (ATM) é uma dor na ATM com característica de inflamação. Assinale a alternativa correspondente a todas as características clínicas que podem estar presentes nesse caso.

- (A) Artralgia, edema, eritema e má oclusão aguda de mordida aberta ipsilateral
- (B) Edema, eritema e má oclusão aguda de mordida aberta ipsilateral
- (C) Somente má oclusão aguda de mordida aberta ipsilateral
- (D) Artralgia, edema, eritema e má oclusão aguda de mordida aberta contralateral
- (E) Edema, eritema e má oclusão aguda de mordida aberta contralateral

QUESTÃO 52

O deslocamento de disco na articulação temporomandibular (ATM) ocorre quando o disco articular localizado entre a mandíbula e o osso temporal se move de sua posição normal, podendo ocasionar dor, desconforto e restrições nos movimentos da mandíbula. Entre os fatores etiológicos para o deslocamento de disco, estão: degeneração articular, falta de lubrificação, macro ou microtraumas, frouxidão dos ligamentos da ATM, alteração na forma do disco e hiperatividade do músculo

- (A) temporal.
- (B) masseter.
- (C) pterigoideo medial.
- (D) pterigoideo lateral.
- (E) digástrico.

Área livre

QUESTÃO 53

Doença articular degenerativa é um distúrbio degenerativo envolvendo a articulação temporomandibular (ATM), caracterizado por deterioração do tecido articular com alterações ósseas concomitantes no côndilo e (ou) eminência articular. No histórico, o paciente deve relatar qualquer ruído da ATM, nos últimos 30 dias, presente com o movimento da mandíbula em função ou qualquer ruído presente durante o exame. Além disso, no decorrer do exame físico, o dentista deve notar crepitação detectada com palpação durante abertura, fechamento, lateralidade e (ou) protrusão. O exame padrão de referência para diagnóstico de degeneração da ATM é

- (A) ressonância nuclear magnética.
- (B) tomografia computadorizada.
- (C) radiografia panorâmica.
- (D) ultrassonografia.
- (E) radiografia transcraniana.

QUESTÃO 54

Uma mulher de 32 anos de idade, saudável, apresentou ptose palpebral depois da aplicação facial de toxina botulínica do tipo A para harmonização. O efeito da toxina botulínica e o seu mecanismo de ação são, respectivamente, redução do(a)

- (A) tônus muscular e inibição da liberação de acetilcolina.
- (B) atividade neuronal motora e estimulação da liberação de acetilcolina.
- (C) contração muscular e bloqueio de receptores de acetilcolina na placa neuromuscular.
- (D) atividade neuronal e bloqueio da recaptção neuronal de acetilcolina.
- (E) ativação do neocórtex e bloqueio de acetilcolinesterase.

Área livre

QUESTÃO 55

O uso de medicamentos antitrombóticos tem sido cada vez mais frequente, de maneira que causa preocupação quanto ao risco de sangramento diante de intervenções odontológicas cirúrgicas. Essa indicação é para a prevenção de eventos trombóticos, cuja etiologia é multifatorial, incluindo a predisposição genética e fatores como arteriosclerose, imobilização prolongada, tabagismo, entre outros.

Acerca dos antitrombóticos e de seu manejo farmacológico no contexto de cirurgias odontológicas, assinale a alternativa correta.

- (A) AAS e clopidogrel são antiagregantes plaquetários que provocam o aumento do tempo de protrombina e, portanto, devem ser descontinuados antes de intervenções que provocam sangramento.
- (B) O principal mecanismo de ação das heparinas é a inibição irreversível do tromboxano nas plaquetas, o que pode ser revertido por meio da administração de ácido épsilon aminocaproico em um episódio de hemorragia.
- (C) Não há risco de sangramento com o uso de dabigatrana, um anticoagulante oral direto da trombina.
- (D) O ácido tranexâmico é um antifibrinolítico que promove a síntese de plasmina, aumentando a atividade proteolítica do plasminogênio, logo, pode ser utilizado para estancar hemorragias.
- (E) A avaliação do risco de sangramento de pacientes sob uso de varfarina deve ser realizada por meio do INR.

QUESTÃO 56

A clindamicina é um antibiótico indicado para o tratamento de infecções odontogênicas em pacientes alérgicos a penicilinas. A respeito da clindamicina, assinale a alternativa correta.

- (A) É sensível às betalactamases.
- (B) É ativa contra gram-positivos, gram-negativos e espiroquetas, o que indica seu uso em infecções odontogênicas, inclusive nas de origem periodontal.
- (C) Apresenta boa distribuição em tecido ósseo e áreas de abscesso.
- (D) Sua prescrição deve ser realizada em receituário de controle especial, de acordo com a legislação vigente.
- (E) É um inibidor da síntese da parede celular e, portanto, apresenta segurança para uso em gestantes.

QUESTÃO 57

Conforme o art. 34 do Código de Ética Odontológico, no exercício do magistério, o profissional inscrito exaltar os princípios éticos e promoverá a divulgação do código. Assinale a alternativa que indica infração ética de um profissional no exercício do magistério.

- (A) Utilizar informações do paciente em aula ou pesquisa.
- (B) Deixar de orientar os trabalhos executados em pacientes pelos alunos.
- (C) Encaminhar pacientes para clínica particular, valendo-se da condição de professor.

- (D) Permitir que o aluno realize atividades clínicas em pacientes em programa de estágio fora da sua instituição.
- (E) Encaminhar pacientes para cursos de aperfeiçoamento, atualização ou especialização quando houver indicação de atendimento especializado.

QUESTÃO 58

Considere que um auxiliar de saúde bucal (ASB) tenha postado, em uma rede social, fotos da clínica durante um atendimento no qual foi possível identificar o paciente. Nesse caso, o profissional responsável pela clínica

- (A) pode responder por infração ética, uma vez que deixou de orientar o ASB quanto ao sigilo profissional.
- (B) pode responder por infração ética, visto que permitiu que um fato sigiloso em razão do exercício de sua profissão fosse divulgado.
- (C) pode responder por infração ética, pois fez referência a casos clínicos em que foi possível identificar o paciente.
- (D) pode responder por infração ética, porque permitiu que a imagem do paciente fosse divulgada.
- (E) não pode responder por infração ética, já que não foi o responsável pela quebra de sigilo.

QUESTÃO 59

O programa Previne Brasil, instituído pela Portaria nº 2.979/2019, foi um modelo de financiamento que alterou as formas de repasse das transferências de recursos financeiros aos municípios, os quais passaram a ser distribuídos por meio de três critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. Quanto ao pagamento por desempenho, foram utilizados sete indicadores, um deles relacionado a saúde bucal. Assinale a alternativa que representa esse indicador.

- (A) Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até a décima segunda semana de gestação.
- (B) Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.
- (C) Cobertura de primeira consulta odontológica programada.
- (D) Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na Atenção Primária à Saúde.
- (E) Proporção de atendimentos domiciliares realizados pela Equipe de Saúde Bucal em relação ao total de atendimentos odontológicos individuais.

QUESTÃO 60

Qual é a indicação de radiografias periapicais intrabucais?

- (A) Diagnóstico de lesões de cárie proximais iniciais
- (B) Avaliação da adaptação das restaurações
- (C) Avaliação de sinusopatias
- (D) Detecção de infecção/inflamação apical
- (E) Avaliação de perdas ósseas alveolares iniciais

ATENÇÃO

**Aguarde a autorização do
fiscal para iniciar a prova.**

Realização

**iades**

Instituto Americano de Desenvolvimento