Instituto Americano de Desenvolvimento

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA (SEASTER)

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR

CONCURSO PÚBLICO C-186

EDITAL Nº 01/SEAD-SEASTER, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018.

JUSTIFICATIVAS PARA AS ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR

101 - Enfermeiro

46-A/42-B/40-C/50-D: a questão foi anulada, poisnão há alterantiva correta, de acordo com a seguintereferência, utilizada na elaboração da referida questão:

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia pós-exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV, IST e hepatites virais. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2018.

Essa referência informa, na página 43, que, para o seguimento laboratorial das infecções sexualmente transmissíveis (IST), todos os exames laboratoriais devem ser realizados no início da profilaxia pós-exposição (PEP), duas semanas após a introdução desta, e quando necessário, a critério médico. No entanto, ao mesmo tempo em que a referência descreve o exposto, ela apresenta a tabela a seguir, que indica que o teste de HIV não necessita ser realizado na segunda semana após o início da PEP.

Quadro 13 — Recomendação de exames laboratoriais para seguimento da PEP

EXAMES LABORATORIAIS	PRIMEIRO ATENDIMENTO(IO)	2° SEMANA APÓS INÍCIO DA PEP	4° SEMANA APÓS INÍCIO DA PEP	12° SEMANA APÓS INÍCIO DA PEP
Creatinina ^(a) , ureia	X	X		
ALT, AST	X	X		
Amilase	X	X		
Glicemia ^(b)	Х	Х		
Hemograma ^(c)	X	X		
Teste de HIV	Х		X	X

Fonte: DIAHV/SVS/MS.

[™]Para cálculo do *ciearance* de creatinina.

Brasília-DF, 12 de março de 2019.

Coordenação Pedagógica Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES

⁶³ Em caso de pessoa exposta com diabetes mellitus.

⁽c) Quando em uso de AZT.

⁶⁰Na impossibilidade de coleta de exames, fornecer PEP e pedidos de exames para a segunda semana.