

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE / GERÊNCIA DE ENSINO**  
**EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 01/2020, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020.**  
**SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – INGRESSO EM 2021**

**JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR**

**Acesso Direto – (402) Anestesiologia, (403) Cirurgia Geral, (422) Área Cirúrgica Básica, (404) Clínica Médica, (405) Dermatologia, (408) Medicina de Família e Comunidade, (410) Neurocirurgia, (412) Ginecologia e Obstetrícia, (414) Ortopedia e Traumatologia, (415) Otorrinolaringologia, (417) Pediatria e (418) Psiquiatria.**

**Questão 49-A/47-B/45-C/43-D:** a questão foi anulada, pois o Componente Neonatal é afetado pela assistência pré-natal: "A mortalidade no período neonatal (de 0 a 27 dias de vida) é particularmente influenciada pelas condições da gestação e do parto. A cobertura e a qualidade da assistência pré-natal e perinatal são fatores de grande importância da determinação da mortalidade infantil neonatal." Logo, não há alternativa correta para a questão.

Referência bibliográfica: Medronho e Colaboradores (2009) - página 51- TMI.

**(521) Cirurgia de Mão.**

**Questão 15-U:** a questão foi anulada, pois o enunciado não apresentou informações suficientes para determinar a localização correta da hérnia discal. Sendo assim, não há alternativa correta.

**Questão 30-U:** a questão foi anulada, pois, de acordo com a classificação de Mathes-Nahai, tem-se "vários pedículos – sartório, tibial anterior." Sendo assim, não há alternativa correta (a alternativa A está incorreta, uma vez que apresenta somente um pedículo dominante – tensor da fascia lata).

**Questão 42-U:** a questão foi anulada, pois o melanoma cutâneo é um tipo de câncer que tem origem nos melanócitos (células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele) e tem predominância em adultos brancos. Desta forma a questão apresenta mais de uma alternativa correta (C e D).

**Disponível em:** <<http://www.fcecon.am.gov.br/cancer/cancer-de-pele/#:~:text=O%20melanoma%20cut%C3%A2neo%20%C3%A9%20um,sua%20alta%20possibilidade%20de%20met%C3%A1stase>>.

**(504) Cirurgia do Aparelho Digestivo, (523) Cirurgia Geral R3, (505) Cirurgia Pediátrica, (506) Cirurgia Plástica, (508) Cirurgia Vascular, (509) Coloproctologia e (517) Urologia.**

**Questão 23-U:** a questão foi anulada, pois as metástases linfonodais podem ocorrer, mesmo sendo extremamente raras. Portanto, a questão apresenta duas alternativas corretas (B e E).

Referência bibliográfica: Sabiston 20th, página 768.

**Questão 24-U:** a questão foi anulada, pois a alternativa "D" apontada como correta pelo gabarito preliminar apresenta a classificação de Balthazar como "D", no entanto, para que se mantivesse como correta, a alternativa deveria ter sido classificada como "E". Portanto, não há alternativa correta.

Referência bibliográfica: 1. Balthazar, E. J., Robinson, D. L., Megibow, A. J., & Ranson, J. H. (1990). Acute pancreatitis: value of CT in establishing prognosis. *Radiology*, 174(2), 331-336. 2. Balthazar EJ. CT diagnosis and staging of acute pancreatitis. *Radiol Clin North Am.* 1989 Jan;27(1):19-37. PMID: 2642273. 3. MD RDB, MD BME, MD KLM. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, 20e. Edição: 20. MD CMTJ, editor. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016.

**Questão 43-U:** a alternativa da questão foi alterada para A, pois os IPNM de ductos principais podem ser acometidos de malignidade variável, chegando a 65% dos casos.

Referência bibliográfica: Schwartz - Principles of Surgery - 11ª Ed - Pág 1500-1503.

**Questão 49-U:** a questão foi anulada, pois o texto da alternativa "D" não deixou claro a respeito da maior prevalência da RCUI na colangite esclerosante primária, o que a tornou correta. Sendo assim, a questão possui duas alternativas corretas (C e D).

**(510) Endocrinologia e Metabologia, (511) Gastroenterologia, (524) Geriatria, (514) Nefrologia e (515) Pneumologia.**

**Questão 48-U:** a questão foi anulada, pois as alternativas B e C estão corretas. De acordo com o livro de Harrison's Principles of Internal Medicine, 20ª edição, Capítulo 130, página 975 (tradução nossa): "O tratamento para bacteriúria assintomática não reduz a frequência de infecções sintomáticas ou complicações, exceto em pacientes grávidas, em pacientes submetidos a cirurgias urológicas e, por vezes, em pacientes neutropênicos ou submetidos a transplante renal. O tratamento de bacteriúria assintomática em pacientes grávidas ou em pacientes submetidos a procedimentos urológicos deve ser prescrito com base em urinálise. Nos outros grupos, não se recomenda restabelecimento ou tratamento para bacteriúria assintomática."

**(513) Mastologia.**

**Questão 25-U:** a questão foi anulada, pois o texto da alternativa "D" não deixou claro a respeito da maior prevalência da RCUI na colangite esclerosante primária, o que a tornou correta. Sendo assim, a questão possui duas alternativas corretas (C e D).

**Questão 32-U:** a questão foi anulada, pois não apresenta alternativa correta. Conforme o caso apresentado, a paciente apresenta uma PA = 150 mmHg x 90 mmHg, havendo contraindicação para ergotamina, pois, de acordo com o Manual e Programa de estudos (ALSO), esse alcaloide vasoconstritor é contraindicado em mulheres com pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, ou hipertensão crônica.

**Questão 33-U:** a questão foi anulada, pois o texto da alternativa E permite concluir que o uso da aspirina poderia ser uma opção em qualquer momento da gestação. No entanto, o uso de acetilsalicílico somente é indicado depois de 12 semanas da gestação, conforme apresentado pela VI Diretrizes Brasileiras. Portanto, a questão não apresenta alternativa correta.

**(607) Endoscopia Ginecológica.**

**Questão 17-U:** a questão foi anulada, pois não apresenta alternativa correta. Conforme o caso apresentado, a paciente apresenta uma PA = 150 mmHg x 90 mmHg, havendo contraindicação para ergotamina, pois, de acordo com o Manual e Programa de estudos (ALSO), esse alcaloide vasoconstritor é contraindicado em mulheres com pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, ou hipertensão crônica.

**Questão 18-U:** a questão foi anulada, pois o texto da alternativa E permite concluir que o uso da aspirina poderia ser uma opção em qualquer momento da gestação. No entanto, o uso de acetilsalicílico somente é indicado depois de 12 semanas da gestação, conforme apresentado pela VI Diretrizes Brasileiras. Portanto, a questão não apresenta alternativa correta.

**Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021.**

**Coordenação Pedagógica  
Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES**