



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE / DIVISÃO DE ENSINO E SERVIÇO

SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2023

**PROGRAMA  
003**

**(522) Cirurgia de Cabeça e Pescoço**

**Tipo “U”**

**Data da prova:  
Domingo, 27/11/2022.**

### INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
  - 1 (um) caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e
  - 1 (uma) folha de respostas personalizada da prova objetiva.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

***Coragem, perseverança e paixão.***

- Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha de respostas da prova objetiva.
- Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala.
- Você somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o caderno de prova no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao término do tempo destinado à realização da prova objetiva.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

### INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
- Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
- A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

**PROVA OBJETIVA****CIRURGIA GERAL**  
**Questões de 1 a 25****QUESTÃO 1** \_\_\_\_\_

As infecções que resultam em abscessos perianais originam-se no plano interesfinteriano, mais provavelmente em uma das glândulas anais. Isso pode resultar em um abscesso interesfinteriano simples ou pode se estender verticalmente, no sentido cranial ou caudal, horizontalmente, ou circunferencialmente, com várias apresentações clínicas. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) Um abscesso interesfinteriano é limitado ao sítio primário de origem e pode ser assintomático ou resultar em dor latejante intensa, que se assemelha à dor de uma fissura.
- (B) Se a infecção se disseminar caudalmente, poderá desenvolver um abscesso intermuscular na intimidade da parede retal ou em um abscesso supraelevador.
- (C) O processo infeccioso pode se disseminar cranialmente abrangendo toda a circunferência interesfinteriana, do espaço supraelevador ou da fossa isquiorretal, produzindo o complexo abscesso em ferradura.
- (D) O abscesso suprapúbico é de difícil diagnóstico, pois o paciente pode queixar-se apenas de um vago desconforto, e sem manifestações externas.
- (E) Um abscesso interesfinteriano deve ser drenado seccionando-se o esfíncter externo no nível do abscesso.

**QUESTÃO 2** \_\_\_\_\_

Qual é a causa mais comum de hemorragia digestiva alta?

- (A) Divertículo gástrico
- (B) Neoplasia
- (C) Úlcera gástrica
- (D) Discrasia sanguínea
- (E) Gastrite hemorrágica

**QUESTÃO 3** \_\_\_\_\_

Pacientes transplantados, em imunossupressão clínica, têm maior chance de adquirir infecção pelo citomegalovírus. Esse tipo de infecção pode resultar em

- (A) epididimite.
- (B) pneumonia.
- (C) paniculite.
- (D) colecistite.
- (E) celulite.

**QUESTÃO 4** \_\_\_\_\_

Na neoplasia endócrina múltipla tipo 1, exceto o típico tumor de paratireoide, os indivíduos acometidos também podem desenvolver

- (A) adenoma hepático.
- (B) adenoma gástrico.
- (C) tumor medular da tireoide.
- (D) hemangioma.
- (E) angiofibroma cutâneo.

**QUESTÃO 5** \_\_\_\_\_

Assinale a alternativa que apresenta um fator de risco para o câncer de mama.

- (A) Atividade física regular
- (B) Sexo masculino
- (C) Hiperplasia ductal típica
- (D) Obesidade
- (E) Menarca após os 12 anos de idade

**QUESTÃO 6** \_\_\_\_\_

Uma contraindicação relativa para a radioterapia no câncer de mama é a

- (A) hipertensão arterial sistêmica.
- (B) mutação do gene p53.
- (C) dermatomiosite.
- (D) doença pulmonar leve.
- (E) inabilidade de realizar decúbito lateral.

**QUESTÃO 7** \_\_\_\_\_

Assinale a alternativa que indica quais são as células que produzem a grelina e a parte do estômago em que são produzidas, respectivamente.

- (A) Células parietais no corpo do estômago.
- (B) Células D no antro do estômago.
- (C) Células G no antro do estômago.
- (D) Células G no corpo do estômago.
- (E) Células endócrinas no corpo do estômago.

**Área livre**

## QUESTÃO 8

O tétano pode complicar uma ferida perfurante, e o estado de imunização antitetânica do paciente deve ser revisado para garantir a proteção. Acerca do esquema vacinal para tétano, preconizado pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O esquema vacinal completo recomendado é de três doses administradas no primeiro ano de vida, com reforços aos 15 meses e aos 5 anos de idade.
- (B) Após o esquema vacinal completo na infância, deve ser feito um reforço a cada cinco anos.
- (C) Em casos de ferimentos graves ou de gestação, deve-se sempre antecipar a dose de reforço pelo risco de contaminação.
- (D) Vacinas contendo toxoide tetânico e imunoglobulina antitetânica devem ser administradas a pacientes cujo estado de imunização é incerto.
- (E) Indivíduos que completaram apenas a série primária de imunização devem receber imunoglobulina antitetânica.

## QUESTÃO 9

Uma paciente de 26 anos de idade, vítima de acidente automobilístico do tipo moto-automóvel, compareceu à emergência levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com FC = 126 bpm, PA = 80 mmHg x 40 mmHg, FR = 30 irpm e SatO<sub>2</sub> = 89%. Ao exame físico, encontrava-se consciente, com sinais de contusão no abdome e na pelve, com hematomas nesses locais. Quanto ao atendimento inicial ao trauma em nível hospitalar, segundo o Suporte de Vida Avançado no Trauma (ATLS), 10ª edição, assinale a alternativa correta.

- (A) Em mulheres no período menstrual, deve ser investigada a presença de tampões que, se deixados no local, podem levar à sepse tardia.
- (B) O cateter urinário deve ser inserido precocemente para avaliar a resposta à reposição volêmica.
- (C) Os exames das regiões perineal, vaginal e retal devem ser realizados após a avaliação primária.
- (D) As grandes lesões pélvicas são causa frequente de choque e são facilmente detectadas ao exame físico.
- (E) Quando disponível, a tomografia computadorizada de abdome deve ser indicada nos casos de trauma abdominal contuso.

## QUESTÃO 10

No exame físico em crianças, deve ser sempre realizada a palpação da região cervical, pois aproximadamente 2% das crianças têm nódulos tireoidianos palpáveis. A respeito dos nódulos tireoideanos na população pediátrica,

- (A) a prevalência é igual em mulheres e em homens.
- (B) a maioria dos cânceres de tireoide pediátricos é hereditária.
- (C) eles são tratados principalmente com base nos resultados da aspiração por agulha fina.
- (D) as crianças com câncer de tireoide raramente apresentam doença avançada.
- (E) a radiação ionizante está presente na maioria das crianças que desenvolvem câncer de tireoide.

## QUESTÃO 11

A anatomia é a base para o desenvolvimento da cirurgia como um todo. Assinale a alternativa que indica o nervo responsável pela sensibilidade do lábio inferior.

- (A) Nervo facial.
- (B) Nervo mandibular.
- (C) Nervo troclear.
- (D) Nervo abducente.
- (E) Nervo glossofaríngeo.

## QUESTÃO 12

A hérnia diafragmática de Bochdalek situa-se no(a)

- (A) hiato esofágico do diafragma.
- (B) porção posterior direita do diafragma.
- (C) porção anterior direita do diafragma.
- (D) porção posterior esquerda do diafragma.
- (E) porção anterior esquerda do diafragma.

## QUESTÃO 13

A síndrome de Zollinger-Ellison é caracterizada por doença ulcerosa grave, causada por hipersecreção ácida gástrica secundária a tumores de células não beta do pâncreas. A característica mais marcante desses tumores é o fato de produzirem gastrina, razão pela qual são chamados de gastrinomas. Cerca de 90% desses tumores localizam-se em uma área denominada triângulo do gastrinoma, que é delimitada pelos

- (A) ducto cístico, pela junção da segunda e da terceira porções do duodeno e pela junção entre o colo e o corpo pancreático.
- (B) corpo do pâncreas, pela grande curvatura do estômago e pelo arco duodenal.
- (C) corpo do pâncreas, pela pequena curvatura do estômago e pelo arco duodenal.
- (D) arco duodenal, pela artéria esplênica e pelo ducto cístico.
- (E) arco duodenal, pelo colo transverso e pelo ducto cístico.

Área livre

## QUESTÃO 14

A semiologia continua sendo a parte mais importante da relação médico-paciente e é indispensável para se diagnosticar corretamente as diversas doenças. O sinal de Danforth é a dor no ombro associada à inspiração profunda e se correlaciona com o (a)

- (A) pneumoperitônio.
- (B) colecistite aguda.
- (C) gastrite.
- (D) diverticulite aguda.
- (E) hemoperitônio.

## QUESTÃO 15

Em relação às neoplasias císticas mucinosas (NCM) do pâncreas, é correto afirmar que

- (A) uma história de pancreatite pode ser encontrada em até 20% dos pacientes, o que explica o diagnóstico comumente errôneo de pseudocisto.
- (B) geralmente são encontradas apenas no corpo do pâncreas.
- (C) são muito observadas em mulheres jovens, porém, a média de idade da apresentação é em torno dos 60 anos.
- (D) a observação com imagem seriada é o protocolo de conduta padrão, dado o baixo potencial para transformação maligna.
- (E) são as neoplasias císticas menos comuns do pâncreas.

## QUESTÃO 16

O trauma renal pode ser classificado por graus. O grau III corresponde à (a)

- (A) lesão da artéria ou da veia renal com hemorragia contida.
- (B) laceração do parênquima renal que se estende pelo cortex, pela medula e pelo sistema pielocalicial.
- (C) laceração com mais de 1 cm de profundidade no cortex renal, sem ruptura do sistema pielocalicial ou extravasamento de urina.
- (D) hematoma subcapsular não expansivo, sem laceração do parênquima.
- (E) hematoma perirrenal confinado ao retroperitônio.

## QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que apresenta indicação de exploração cirúrgica do pescoço em razão de trauma contuso do local.

- (A) Pulso radial diminuído
- (B) Disfonia/alteração da voz
- (C) Lesão cortocontusa em deltoide
- (D) Sangue na parede torácica
- (E) Equimose no local

Área livre

## QUESTÃO 18

Qual é o tipo mais frequente de invaginação intestinal?

- (A) Colo-cólica
- (B) Íleo-ileal
- (C) Colo sigmóide
- (D) Íleo-ceco-cólica
- (E) Íleo-cecal

## QUESTÃO 19

Uma das formas de se diferenciar a hemorragia digestiva alta da baixa, é a realização do(a)

- (A) exame físico abdominal.
- (B) hemograma completo.
- (C) tomografia computadorizada.
- (D) a passagem da sonda nasogástrica.
- (E) sangue nas fezes.

## QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que apresenta contraindicação para a doação de rim *in vivo*.

- (A) Cólica renal
- (B) Acometimento psiquiátrico significativo
- (C) Infarto agudo do miocárdio prévio
- (D) Índice de massa corporal < 40
- (E) Refluxo gastro esofágico

## QUESTÃO 21

Assinale a alternativa que indica um medicamento que causa hipotireoidismo iatrogênico.

- (A) Epinefrina
- (B) Aminoglicosídeo
- (C) Dopamina
- (D) Noradrenalina
- (E) Interferon gama

Área livre

## QUESTÃO 22

A respeito do divertículo de Meckel, assinale a alternativa correta.

- (A) É a persistência da extremidade uretral intestinal do ducto onfalomesentérico.
- (B) Mais de 20% dos pacientes sintomáticos têm divertículo que contém mucosa gástrica ectópica.
- (C) É encontrado em aproximadamente 1% da população.
- (D) Costuma ter 5 cm de comprimento.
- (E) Localiza-se sempre a 61 cm da válvula ileocecal.

## QUESTÃO 23

A artéria tireóidea ima tem origem variável, e uma das possibilidades de seu surgimento é a artéria

- (A) vertebral direita.
- (B) subclávia.
- (C) carótida comum esquerda.
- (D) vertebral esquerda.
- (E) tireoidiana superior direita.

## QUESTÃO 24

Assinale a alternativa que indica as três características da tríade de Borchardt.

- (A) Distensão e dor epigástrica; impossibilidade de se passar um cateter nasogástrico; esforços para vomitar, sem êxito.
- (B) Hipofonese de sons cardíacos/bulhas ou bulhas/sons cardíacos abafados; ingurgitamento jugular; hipotensão arterial.
- (C) Dor abdominal em cólica; febre; icterícia.
- (D) Hipotensão arterial; abolição da ausculta pulmonar; deslocamento mediastinal aos raios X de tórax.
- (E) Hemorragia digestiva alta, ascite e hepatomegalia.

## QUESTÃO 25

Assinale a alternativa que indica um dos critérios de Atlanta para a pancreatite aguda.

- (A) Amilase > 1000 UI/L
- (B) Pneumonia intersticial
- (C) Lipase > 500 UI/L
- (D) Fibrinogênio < 1 g/L
- (E) Edema pancreático

Área livre

## OTORRINOLARINGOLOGIA

Questões de 26 a 50

## QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que indica uma contraindicação para o implante coclear.

- (A) Otosclerose com ossificação parcial da cóclea
- (B) Surdez unilateral
- (C) Agenesia do VIII par craniano
- (D) Idoso com mais de 80 anos de idade
- (E) Aplasia de Mondini

## QUESTÃO 27

Os principais agentes etiológicos responsáveis pela otite externa são

- (A) *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae*.
- (B) *Staphylococcus epidermidis* e *Aspergillus fumigatus*.
- (C) *Pseudomonas aeruginosa* e *Candida albicans*.
- (D) *Streptococcus pyogenes* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- (E) *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*.

## QUESTÃO 28

Quanto aos exames de imagem utilizados para detecção dos tumores nasossinusais, assinale a alternativa correta.

- (A) A ressonância nuclear magnética (RNM) é superior à tomografia computadorizada (TC), porém, se possível, o uso combinado dos dois métodos é preferencial.
- (B) A TC é superior à RNM.
- (C) A TC e a RNM são métodos equivalentes, podendo-se optar por uma ou por outra.
- (D) O uso de TC e de RNM torna-se indispensável para o adequado diagnóstico.
- (E) A cintilografia com gadolínio é um exame importante para os principais tumores dessa região.

Área livre

## QUESTÃO 29

Quais são os eventos associados à síndrome do tensor tônico do tímpano?

- (A) Disfunções temporomandibulares e doenças vasculares.
- (B) Doenças vasculares e depressão.
- (C) Distúrbios desmielinizantes e transtorno de ansiedade.
- (D) Lesão cervical causada por *whiplash* e lesão por choque acústico.
- (E) Lesão cervical causada por *Whiplash* e depressão.

## QUESTÃO 30

Em relação aos valores pressóricos (VP), quando está indicada a troca de equipamento de CPAP para BiPAP?

- (A) VP abaixo de 15 cmH<sub>2</sub>O
- (B) VP acima de 15 cmH<sub>2</sub>O
- (C) VP de, no máximo, 15 cmH<sub>2</sub>O
- (D) VP acima de 20 cmH<sub>2</sub>O
- (E) VP em qualquer nível, se o paciente não se adaptar bem ao aparelho de CPAP.

## QUESTÃO 31

Uma criança de 1 ano e 10 meses de idade foi levada pelos pais ao serviço de pronto atendimento de otorrinolaringologia. Referiram que a criança apresentou um episódio de otalgia esquerda, com remissão após uso de analgésicos, e negaram febre, astenia, uso recente de antibióticos ou comorbidades. À otoscopia, observa-se membranas timpânicas hiperemiadas, levemente abauladas e com discreto comprometimento bilateral de sua mobilidade.

Assinale a alternativa que indica a melhor conduta para o caso apresentado.

- (A) Receitar analgésicos e antibiótico de amplo espectro para resolução mais rápida dos sintomas.
- (B) Prescrever dose única de ceftriaxona no hospital e dar seguimento domiciliar ao tratamento com antibiótico oral.
- (C) Realizar timpanocentese com drenagem da secreção, cultura e antibiograma.
- (D) Orientar os pais acerca dos sinais e dos sintomas de gravidade, prescrever analgésicos e amoxicilina e solicitar reavaliação em 48 horas.
- (E) Prescrever amoxicilina com clavulanato na dose de 90 mg/kg ao dia e reavaliar após 48 horas.

Área livre

## QUESTÃO 32

Acerca do tratamento da disfunção temporomandibular (DTM), assinale a alternativa correta.

- (A) Pode alterar a intensidade e a percepção do zumbido. Deve-se orientar o paciente mesmo que seja de forma transitória.
- (B) O zumbido grave tem menos chance de melhorar com o tratamento da DTM devido à participação de outras áreas do sistema nervoso central, além do estímulo proveniente da DTM.
- (C) Tem importância na gravidade do zumbido, tanto precoce quanto tardiamente.
- (D) Trabalhos científicos mostram que pacientes com DTM apresentam baixa somatização.
- (E) O tratamento da DTM não faz diferença na melhora do zumbido.

## QUESTÃO 33

Assinale a alternativa que apresenta os casos nos quais é indicado o uso da pressão aérea positiva (PAP), como primeira opção terapêutica, em crianças com síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS).

- (A) Obesidade, hipertrofia adenoideana, SAOS residual após adenotonsilectomia.
- (B) Anomalias craniofaciais e hipertrofia adenotonsilar e de cornetos inferiores.
- (C) Anomalias craniofaciais, obesidade hipertrofia adenotonsilar.
- (D) SAOS residual após adenotonsilectomia, hipertrofia adenoideana e de cornetos inferiores.
- (E) Anomalias craniofaciais, obesidade, SAOS residual após adenotonsilectomia.

Área livre

### QUESTÃO 34

Em relação aos papilomas laríngeos, assinale a alternativa correta.

- (A) Em crianças que dificultam a realização do exame de videolaringoscopia, pode ser realizada a laringoscopia direta.
- (B) A extensão dessas lesões glóticas para a infra ou para a supraglote é rara.
- (C) Ocorre displasia em aproximadamente 50% dos casos em adultos.
- (D) A displasia se apresenta em cerca de 40% dos casos em crianças.
- (E) Acontece com maior frequência entre meninos, na infância, e em mulheres, na vida adulta.

### QUESTÃO 35

O câncer de laringe pode se apresentar nas regiões glóticas, supra e infraglóticas. Quais são os sintomas iniciais mais prevalentes da região supraglótica da laringe?

- (A) Disfonia e dispneia
- (B) Disfagia e metástases cervicais
- (C) Dispneia e metástases cervicais
- (D) Disfonia e metástases cervicais
- (E) Disfonia e disfagia

### QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que indica os principais agentes que podem estar relacionados às malformações de orelha interna.

- (A) Antimaláricos e ruído
- (B) Antibióticos e raios ultravioletas
- (C) Anti-inflamatórios e ruído
- (D) Radiação e ruído
- (E) Álcool e vírus

### QUESTÃO 37

Quais são os principais mediadores químicos produzidos na cascata inflamatória da rinite alérgica?

- (A) Interleucinas e quimiocinas
- (B) Quimiocinas, histamina e leucotrienos
- (C) Histamina, leucotrienos, interleucinas e prostaglandinas
- (D) Prostaciclina, prostaglandinas e histamina
- (E) Fator de ativação de plaquetas e quimiocinas

Área livre

### QUESTÃO 38

As fissuras labiopalatinas fazem parte da rotina do otorrinolaringologista. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de fissura labiopalatina mais encontrado.

- (A) Fissura transforame esquerda
- (B) Fissura transforame direita
- (C) Fissura pré-forame
- (D) Fissura pós-forame
- (E) Fissura transforame bilateral

### QUESTÃO 39

As otites médias agudas estão presentes na prática clínica diária do otorrinolaringologista. A principal complicação intracraniana das otites médias agudas em criança é conhecida como

- (A) abscesso cerebral.
- (B) otomastoidite.
- (C) meningite.
- (D) trombose do seio sigmoide.
- (E) abscesso cerebelar.

### QUESTÃO 40

A respeito da fibrose cística, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos pacientes portadores dessa enfermidade, é comum a pan-opacificação do seio frontal.
- (B) Os sintomas clínicos referentes à rinossinusite e à polipose, nos pacientes com fibrose cística, já são encontrados logo nos primeiros 6 meses de vida.
- (C) O teste do sódio e do cloro no suor é considerado positivo quando os valores forem acima de 45 mEq/L.
- (D) O teste de *screening* genético exclui a doença.
- (E) Os testes genéticos incluem as 25 mutações mais frequentes e detectam 85% dos casos de fibrose cística.

Área livre

### QUESTÃO 41

O principal tipo histológico de tumor que acomete a faringe é o

- (A) carcinoma basocelular.
- (B) carcinoma espinocelular.
- (C) adenocarcinoma.
- (D) linfoma.
- (E) sarcoma.

### QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que indica o principal músculo intrínseco da laringe, responsável por diminuir o *pitch* vocal, o que resulta em uma voz mais grave.

- (A) Cricotireóideo
- (B) Cricoaritenóideo posterior
- (C) Tireoaritenóideo
- (D) Cricoaritenóideo lateral
- (E) Interaritenóideo

### QUESTÃO 43

A respeito do abscesso peritonsilar, assinale a alternativa correta.

- (A) Os principais sintomas são odinofagia, trismo, voz anasalada, febre e queda do estado geral.
- (B) É, geralmente, bilateral.
- (C) A tomografia computadorizada (TC) é necessária para verificar a extensão do abscesso e, em alguns casos, para confirmação diagnóstica.
- (D) O tratamento consiste no uso da amoxicilina endovenosa.
- (E) O tratamento consiste no uso de cefalosporina de primeira geração.

### QUESTÃO 44

Qual é a principal causa de perfuração septal?

- (A) Traumática
- (B) Inflamatória
- (C) Idiopática
- (D) Infecçiosa
- (E) Uso de vasoconstritores tópicos

Área livre

### QUESTÃO 45

O comprometimento do seio cavernoso por extensão de tumores da base do crânio pode levar a alterações motoras do olho pelo envolvimento dos nervos

- (A) facial e trigêmeo.
- (B) facial e oculomotor.
- (C) olfatório e abducente.
- (D) oculomotor e abducente.
- (E) óptico e oculomotor.

### QUESTÃO 46

Os transtornos do processamento auditivo central podem ser agrupados como

- (A) desordens de decodificação, de ordenação e de finalização.
- (B) desordens de decodificação, de codificação e de organização.
- (C) desordens de interpretação, de finalização e de organização.
- (D) desordens de interpretação, de organização e de decodificação.
- (E) desordens de decodificação, de organização e de finalização.

### QUESTÃO 47

O trauma acústico ocorre com certa frequência em alguns profissionais da segurança pública. No que tange às suas características, assinale a alternativa correta.

- (A) É irreversível.
- (B) A perda auditiva é geralmente mista.
- (C) As frequências médias e graves são as mais afetadas na audiometria.
- (D) Pode levar à ruptura da membrana timpânica e causar uma perda auditiva mista.
- (E) A perda auditiva é geralmente condutiva.

Área livre

### QUESTÃO 48

A língua geográfica é um quadro comum que atinge de 1% a 14% da população. É mais frequente em crianças e adultos jovens, e tem etiologia desconhecida. Nesse caso, as papilas mais afetadas pela descamação são as

- (A) fungiformes e circunvaladas.
- (B) filiformes.
- (C) foliáceas.
- (D) circunvaladas.
- (E) fungiformes e foliáceas.

### QUESTÃO 49

Acerca do *spreader graft*, é correto afirmar que

- (A) não pode ser utilizado em pacientes com dorso projetado e estreito e teste de Cottle positivo.
- (B) é a técnica indicada para a realização do enxerto com fixação na cruz lateral da cartilagem alar e da abertura piriforme.
- (C) é a melhor indicação para o tratamento do colapso dinâmico da parede lateral à inspiração.
- (D) serve para reforçar a estrutura da válvula nasal externa.
- (E) é indicado para o caso de correção de desvio septal em sua porção dorsal na região da válvula nasal.

### QUESTÃO 50

Assinale a alternativa que corresponde às principais áreas acometidas pelas úlceras traumáticas na boca.

- (A) Palato mole e lábio
- (B) Língua e região sublingual
- (C) Língua, palato mole e lábios
- (D) Língua, lábios e mucosa jugal
- (E) Região sublingual e palato duro

Área livre

Área livre